

## RESOCONTO ORNITOLOGICO BRESCIANO 1986-1988

Alessandro Micheli e Maurizio Busetto

**Cormorano** *Phalacrocorax carbo*: 5 ind. si sono trattiene durante i mesi di giugno e luglio 1988 nella R.N. Torbiere d'Iseo (Mazzotti S.). Il 10 settembre sono stati contati 6 ind. (Gargioni A.). Si tratta del primo caso di estivazione per il bacino del Sebino.

**Tarabuso** *Botaurus stellaris*: 1 ind. a Remedello Sopra il 30 dicembre 1987 (Barbieri G.); l'anno successivo (30 dicembre 1988) è stato trovato un altro in svernante in un canneto perilacustre a Punta Gro (Sirmione) (Micheli A.).

**Sgarza ciuffetto** *Ardeola ralloides*: l'unica segnalazione riguarda 1 ind. trovato nella R.N. Torbiere d'Iseo, il 26 aprile 1988 (Mazzotti S.).

**Airone bianco maggiore** *Egretta alba*: 1 ind. osservato il 9 novembre 1986 insieme a 30 Aironi cenerini *Ardea cinerea* presso un allevamento ittico a Calvisano (Gargioni A.).

**Airone cenerino** *Ardea cinerea*. un gruppo di 50 ind. in transito sulla R.N. Torbiere d'Iseo, il 30 marzo 1988 (Mazzotti S.).

**Oca lombardella** *Anser albifrons*: un'osservazione tardiva (18 maggio 1986) di 1 ind. di questa specie è stata effettuata nella R.N. Torbiere d'Iseo (Mazzotti S.).

**Oca selvatica** *Anser anser*: inusuale, sia per il periodo (27 maggio 1986) sia per la provenienza geografica, l'avvistamento di un soggetto attribuito alla subsp. *rubrirostris* (*Oca selvatica orientale*) a Remedello Sotto (Barbieri G.).

**Edredone** *Somateria mollissima*: 2 juv. hanno sostato a lungo sul lago a Provaglio d'Iseo, durante i mesi ottobre e novembre 1988 (Ballerio G.). Altri 2 ind. sono stati visti sul lago di Garda, a Sirmione, il 21 settembre 1988 (Rossi A.). Avvistamenti in tale periodo si sono avuti in tutta l'Italia settentrionale.

**Moretta codona** *Clangula hyemalis*: 1 femmina di questa specie, di comparsa rara ed irregolare, è stata osservata per tre giorni (13, 14 e 15 dicembre 1988) a Toscolano-Maderno (Piotti G.).

**Orchetto marino** *Melanitta nigra*: 8 ind. (4 maschi e 4 femmine) avvistati sul lago d'Iseo il 15 aprile 1988. Per questo bacino risulta essere il primo gruppo di individui segnalato (Mazzotti S.).

**Falco pecchiaiolo** *Pernis apivorus*: 1 ind. raccolto a Remedello Sotto il giorno 11 dicembre 1986. Probabilmente si trattava di un soggetto attardatosi poiché incapace di intraprendere la regolare migrazione (Barbieri G.).

**Nibbio bruno** *Milvus migrans*: ben 48 ind. osservati il 16 agosto 1988 volteggiare per mezz'ora in uno spettacolare carosello, nella sponda NE del lago d'Idro, al confine col Trentino Alto Adige (Micheli A.).

**Nibbio reale** *Milvus milvus*: fotografato 1 ind. il 7 agosto 1988 a Carpenedolo: molto probabilmente era 1 juv. erratico (Barbieri G.). E la quinta segnalazione degli ultimi vent'anni (BRICHETTI e CAMBI, 1990).

**Sparviere** *Accipiter nisus*: 1 femmina ha svernato dal 28 ottobre 1988 al marzo 1989 all'interno di una «zona di ripopolamento e cattura», tra Gottolengo, Gamba e Prealboino (Gargioni A.).

**Poiana** *Buteo buteo*: 1 ind., ripreso ad Iseo il giorno 8 novembre 1980, era stato inanellato da pullus il 12 giugno dello stesso anno a Kėdainiai, in Lituania, n. 145271 (Ballerio G.).

**Poiana calzata** *Buteo lagopus*: il 3 marzo 1987 è stato visto 1 ind. posato su un albero, all'interno della R.N. Torbiere d'Iseo (Mazzotti S.).

**Falco di palude** *Circus aeruginosus*: il giorno 11 ottobre 1985 è stata raccolta 1 2 ferita da arma da fuoco, nell'anfiteatro morenico meridionale del Garda, inanellata in Cecoslovacchia (n. Museum Praga D 88533). Il soggetto è stato poi inviato al centro recupero rapaci L.I.P.U. di Parma (Busetto M.).

**Falco cuculo** *Falco vespertinus*: due osservazioni tardo primaverili nella bassa pianura: il 4 giugno 1987, visto 1 maschio subadulto posato sui cavi di un elettrodotto a Gottolengo, quindi 1 juv. appostato su un pino presso il F. Chiese, a Calvisano, l'8 giugno 1987 (Gargioni A.). Di notevole interesse l'osservazione di 1 maschio il 5 settembre dello stesso anno, a 1700 m di quota, presso il rifugio Bonardi sul Maniva (Marchesi A.).

**Falco pellegrino** *Falco peregrinus*: l'unica segnalazione è riferita ad 1 ind. in volo lungo le falesie del lago d'Iseo, il 19 novembre 1988 (Mazzotti S.).

**Gru** *Grus grus*: 1 ind. isolato ha sostato tre giorni (15, 16 e 17 marzo 1988) presso una tesa sul F. Mella, tra Bagnolo e Capriano (Bailo M.). Molto rara è la sosta nel nostro territorio.

**Avocetta** *Recurvirostra avosetta*: molto sporadiche le osservazioni di questa specie nella nostra provincia: questa risale al 24 maggio 1986, quando 3 ind. sono capitati in una «tesa» della bassa pianura orientale, a Remedello Sotto (Barbieri G.).

**Piovanello tridattilo** *Calidris alba*: segnalato nel 1988 su entrambi i laghi maggiori: il 10 settembre, 7 ind. sulla sponda meridionale del lago d'Iseo (Mazzotti S.) mentre altri 2, il 16 settembre sulla costa benacense a Sirmione, poi 1 ind. il 21 settembre e quindi 3 il giorno successivo (Rossi A.).

**Pittima minore** *Limosa lapponica*: la scarsità di notizie su questa specie per la nostra provincia rende particolarmente interessante la sosta di due giorni (16-17 settembre 1988) effettuata da un gruppetto di 4 ind. su una spiaggia presso Sirmione (Rossi A.).

**Falaropo beccolargo** *Phalaropus fulicarius*: 1 ind. in abito invernale trovato morto a Ciliverghe nell'aprile 1987 (Brichetti P.). E' la terza segnalazione per il Bresciano (BRICHETTI, 1982).

**Gabbiano comune** *Larus ridibundus*: 1 ind., ferito da arma da fuoco, raccolto a Desenzano; era stato inanellato a Danzica (Rossi Erba M.).

**Mignattino alibianche** *Chlidonias leucopterus*: osservati 3 ind. ancora in abito invernale il 13 maggio 1986, lungo il F. Gambara, a Gambara (Gargioni A.).

**Rondone pallido** *Apus pallidus*: 1 ind. isolato in migrazione visto il 9 ottobre 1988 su un valico montano ad Anfo, Val Sabbia (Micheli A.). Le segnalazioni note antecedenti questa sono solo due (BRICHETTI, 1982).

**Martin pescatore** *Alcedo atthis*: 1 ind. è stato osservato il 9 settembre 1988, presso un laghetto alpino ricco di girini di *Rana temporaria*, nella valle di Campovecchio (Corteno Golgi), a 2300 m (Mazzoldi P.). Nonostante la precarietà della presenza, la quota altimetrica è una delle più alte mai riscontrate per questa specie.

**Torcicollo** *Jynx torquilla*: il 4 dicembre 1988 è stato notato 1 ind. posato a terra, in una boscaglia submediterranea rada, a Toscolano-Maderno (Piotti G.). Potrebbe trattarsi di un occasionale caso di svernamento nell'Italia settentrionale, determinato dal clima mite del settore benacense.

**Allodola** *Alauda arvensis*: il 24 gennaio 1988 è stato rilevato 1 ind. in canto nuziale aereo nella pianura occidentale, a Ospitaletto (Busetto M.).

**Rondine montana** *Ptyonoprogne rupestris*: un unico stormo di 100-120 ind. in migrazione osservato sul M. Alto (Adro) il 16 ottobre 1987 (Mazzotti S.).

**Rondine** *Hirundo rustica*: 1 ind. in volo radente su un canneto perilacustre a punta Gro (Sirmione) il 28 novembre 1986 (Rossi A.).

**Beccofrusone** *Bombycilla garrulus*: la segnalazione dei primi arrivi dell'invasione dell'inverno 1988-89 riguarda 1 individuo imbrancato con Cesene *Turdus pilaris* e Storni *Sturnus vulgaris*, intento a nutrirsi di frutti di *Diospyros kaki*, nel dicembre 1988, a Verolavecchia (Bricchetti P.).

**Pettazzurro** *Luscinia svecica*: osservato 1 ind. della subsp. *cyanecula*, sulla strada vecchia all'interno della R.N. Torbiere d'Iseo, il 9 aprile 1986 (Bailo M.). Ulteriore osservazione di 1 ind. posato su un arbusto di *Salix* il 6 aprile 1987 sul greto del F. Oglio a Bompensiero di Villachiera (Mazzotti S.). Questa specie viene raramente notata durante le sue migrazioni attraverso il nostro territorio.

**Pagliarolo** *Acrocephalus paludicola*: notato per due giorni consecutivi 1 ind. in un lembo di canneto ai bordi di un allevamento ittico a Calvisano, il 9 settembre 1987 (Gargioni A.). In provincia la specie è di comparsa occasionale durante le migrazioni e mancavano segnalazioni da parecchi anni.

**Balia nera** *Ficedula hypoleuca*: degno di nota il ritrovamento di 1 md. a Iseo il 30 agosto 1988, inanellato a Kuhmalahti, Finlandia, n. V 682555, il 27 giugno 1988 (Ballerio G.). Nell'arco di due mesi e tre giorni l'uccello si era spostato a SW di 2009 Km.

**Nocciolaia** *Nucifraga caryocatactes*: il 5 settembre 1986 è stato notato un consistente assembramento di 25 ind. sul M. Orfano, un rilievo miocenico isolato nell'alta pianura bresciana occidentale; tali comparse sono dovute al locale movimento migratorio a corto raggio che si registra periodicamente sull'arco alpino. 1 md. isolato è stato avvistato anche in pieno periodo riproduttivo, il 6 giugno 1987, sul M. Alto presso Adro (Mazzotti S.).

**Zigolo di Lapponia** *Calcarius lapponicus*: 1 ind. è stato avvistato, durante la migrazione tardo-autunnale, in un campo arato, a Iseo, il 14 novembre 1987 (Ballerio G.). Solitamente le segnalazioni di questa specie riguardano il settore orientale della provincia.

**Zigolo nero** *Emberiza cirlus*: il 19 novembre 1986, data tardiva, osservato 1 ind. posato su un pioppo presso punta Gro (Sirmione) (Rossi A.). Nel luglio 1988 un gruppetto di 4 ind. ha trascorso tutto il mese in un incolto a Rovato (Pedrali A.); presumibilmente erano individui allontanatisi dai siti riproduttivi ubicati nelle aree xerotermitiche sebine.