

RESOCONTO ORNITOLOGICO BRESCIANO 1990

Alessandro Micheli e Maurizio Busetto

Cormorano *Phalacrocorax carbo*: la presenza della specie nella Riserva Naturale Torbiere d'Iseo, iniziata nel 1986-87 con la estivazione di alcuni individui, è ora diventata regolare. Solo per un periodo relativamente breve, quando gli specchi d'acqua interni sono inagibili perché ghiacciati, gli uccelli si spostano sul lago; diversi osservatori (Bertoli R., Busetto M., Leo R., Mazzotti S., Pedrali A.) hanno constatato la regolarità e il progressivo incremento del fenomeno.

Nitticora *Nycticorax nycticorax*: dopo qualche anno di assenza (ultima osservazione risalente al giugno 1982, BRICRETTI, 1982), alcuni individui sono stati visti il 19 maggio e il 6, 7 e 11 luglio, nella R.N. Torbiere di Iseo (minimo 1 ad., massimo 2 ad. e 5 juv.) (Bertoli R., Leo R.).

Airone bianco maggiore *Egretta alba*: 1 ind. di questa specie assai rara nella nostra provincia ha sostato almeno due giorni (29 e 30 luglio) nella R.N. Torbiere di Iseo, confermando ancora una volta l'importanza naturalistica di questa zona umida protetta (Mazzotti S.).

Airone cenerino *Ardea cinerea*: si è ripetuto lo svernamento, ma con un notevole aumento degli effettivi rispetto all'inverno 1989-90, infatti sono stati censiti 125 ind. il 3 dicembre e 115 ind. il 17 dicembre, nei campi di stoppie di mais e soia presso l'allevamento ittico di Calvisano (Gargioni A.).

Airone rosso *Ardea purpurea*: l'osservazione di 2 ind., il 6 e l'11 luglio, nella R.N. Torbiere di Iseo, rappresenta un caso di probabile estivazione e fa sperare in una prossima nidificazione nel Bresciano (Bertoli R., Leo R.).

Cicogna nera *Ciconia nigra*: osservato 1 ind. in volo alto sopra la campagna di Rudiano il 9 maggio (Mazzotti S.); precedentemente la specie era stata segnalata circa dieci volte, per lo più durante la migrazione postnuziale (BRICHETTI, 1982).

Casarca *Tadorna ferruginea*: il 15 settembre è stato visto 1 ind. di questa specie, accidentale nel Bresciano, nella R.N. Torbiere di Iseo; il controllo effettuato il giorno successivo risultava vano, e incerta rimane anche la provenienza del soggetto (fuggito dalla cattività?) (Bailo M.).

Volpoca *Tadorna tadorna*: i 4 ind., di questa specie di comparsa rara e poco regolare nel Bresciano, presenti a Punta Gro (Sirmione) il 19 gennaio; a causa dell'attività venatoria dopo due giorni erano scomparsi (Rossi A.).

Fistione turco *Netta rufina*: decisamente insolito il 26 maggio, in avanzata stagione riproduttiva, l'avvistamento di 1 ind. intento ad alimentarsi in un canneto lacustre a Sirmione (Rossi A.). In Lombardia la specie è presente solo come migratrice.

Moretta codona *Clangula hyemalis*: segnalata ancora sul lago di Garda; 1 juv. in riposo a pochi metri dalla riva a Salò, l'8 dicembre (Piotti O.).

Nibbio bruno *Milvus migrans*: decisamente interessante l'osservazione di 1 ind. in volteggio sopra Sabbio Chiese il 26 febbraio (Busetto M.). I primi migratori sono segnalati dalla metà di marzo (data più precoce precedente: 13 marzo (BRICHETTI e CAMBI, 1980)). Nel tardo pomeriggio del 17 giugno contati 42 ind. volteggiare insieme sopra la sponda orientale del lago d'Idro; questo specchio lacustre è ormai interessato da alcuni anni da tali grossi assembramenti (BRICHETTI e FASOLA, 1990; MICHELI e Busetto, 1991) che di solito però si manifestano con regolarità dalla fine di giugno in avanti, quando i giovani si sono già involati (Micheli A.).

Albanella reale *Circus cyaneus*: 1 femmina posata su un albero nella campagna di Treviso Bresciano (circa 750 metri s.l.m.) subito dopo una nevicata (10 cm di neve); erano compresenti una dozzina di Sordani *Prunella collaris* (Micheli A.).

Aquila anatraia maggiore *Aquila clanga*: il 3 dicembre 1 imm. con pochissime macchie bianche sul dorso era posato sullo «Scoglio dell'Altare», a fianco dell'Isola del Garda. (San Felice del Benaco), a poca distanza

da un numeroso gruppo di Cormorani e Gabbiani reali. Infastidito da un nugolo di Cornacchie grigie l'uccello si è poi involato verso l'entroterra di Manerba (Rossi A.). Per la nostra provincia erano note tre segnalazioni: Gardone Riviera, novembre 1929; Villagana, novembre 1947 e Manerbio, ottobre 1970 (BRICHETTI, 1982).

Falco pescatore *Pandion haliaetus*: precoce l'avvistamento di 1 ind. presso Calvisano, il 16 agosto (Gargioni A.); un altro individuo ha sostato nella R.N. Torbiere di Iseo dall'1 settembre al 5 ottobre (Mazzotti S.).

Falco cuculo *Falco vespertinus*: è decisamente precoce l'avvistamento di 3 maschi e 2 femmine posati sui fili del telefono lungo la strada statale tra Lograto e Soncino il 25 marzo (Pedrali A.). Coincide con la fine della migrazione prenuziale l'osservazione di 1 ind. in caccia di insetti il 9 giugno, nella R.N. Torbiere di Iseo (Mazzotti S.).

Lodolaio *Falco subbuteo*: solamente due osservazioni primaverili di questa specie, decisamente rara nel Bresciano. Il 19 maggio, verso sera, osservato 1 ind. posato nelle vicinanze di un appostamento di caccia, sul versante meridionale del M. Orfano a Cologne (Mazzotti E); un altro in volo, sempre all'imbrunire, l'1 giugno sopra i prati falciabili intercalati da lunghi filari di *Alnus glutinosa* e *Populus nigra*, presso Agnosine (Rizzardini M.).

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*: di questa specie accidentale per la nostra provincia vi sono due interessanti segnalazioni: la prima riguarda 1 ind. in perfetto abito nuziale posato sugli scogli detti «I Conigli» poco a N dell'isola di San Biagio (Manerba del Garda), il 15 maggio, mentre la seconda si riferisce ad un altro individuo avvistato il 22 agosto a Punta Gro (Sirmione) (Rossi A.).

Corriere grosso *Charadrius hiaticula*: data la scarsità di notizie riguardanti la specie nella nostra provincia riteniamo utile riportare due osservazioni effettuate sul lago di Garda: 1 ind. associato a 2 Voltapietre *Arenaria interpres* il 21 maggio, sugli scogli «I Conigli» (Manerba del Garda); un gruppo di 10 ind., spiaggia della «Brema» (Sirmione) il 15 settembre. La presenza di soggetti isolati è stata comunque costante dal 23 agosto al 23 ottobre (Rossi A.).

Pivieressa *Pluvialis squatarola*: 1 ind. ancora in abito nuziale osservato il 22 agosto, altri 4 ind. notati il 12 settembre sempre a Punta Gro (Sirmione) (Rossi A.). La specie nella nostra provincia è considerata di comparsa rara ed irregolare.

Voltapietre *Arenaria interpres*: il 21 maggio una coppia in perfetto abito nuziale è stata osservata sugli scogli «I Conigli» presso l'isola di San Biagio (Manerba del Garda) insieme a un Corriere grosso *Charadrius hiaticula*; durante la migrazione postnuziale 1 ind. ha sostato per tre giorni (il 22, 23 e 24 settembre) sugli affioramenti ciottolosi poco distanti dalla spiaggia della «Brema», a Sirmione (Rossi A.). Va ricordato che nel periodo tardo-estivo e autunnale il livello del lago era sceso ad uno dei suoi minimi storici, lasciando così scoperte ampie porzioni riparie fangose e ciottolose; ciò ha favorito la sosta prolungata e l'osservazione di un cospicuo quantitativo di limicoli, come non accadeva da anni; riportiamo, tra le altre, le segnalazioni registrate da Rossi A. in un tratto della sponda meridionale interposta tra le località «Brema» e «Punta Gro» presso Sirmione: 22 agosto: 2 Totani mori, 1 Pivieressa ancora in abito nuziale, 1 Corriere grosso, 1 Piovanello pancianera, 2 Piro piro boscherecci, 3 Piro piro piccoli, 1 Garzetta; 11 settembre: 2 Pantane; 12 settembre: 10 Piovanelli tridattili, 10 Corrieri grossi, 40 Piovanelli pancianera, 10 Gambecchi, 6 Piovanelli, 1 Combattente, 4 Pivieresse; 28 settembre: 1 Totano moro, 6 Piovanelli, 15 Piovanelli pancianera, 15 Gambecchi, 3 Corrieri grossi; 27 novembre: il lago aveva ormai recuperato il livello normale ed erano presenti solo 3 Piovanelli pancianera.

Beccapesci *Sterna sandvicensis*: il 2 giugno vengono osservati 5 ind. posati su pali emergenti al largo della «Brema» (Sirmione) (Rossi A.).

Mignattino *Chlidonias niger*: 3 ind. in abito nuziale hanno sostato dal 14 al 16 giugno nella R.N. Torbiere di Iseo; presumibilmente trattavasi di soggetti in transito (Pedrali A.).

Colombaccio *Columba palumbus*: a fine dicembre, in un dormitorio sito in un pioppeto adiacente il E Oglio, tra Acqualunga (BS) e Azzanello (CR) vengono contati circa 6500 ind. (Caffi M.). Tortora dal collare orientale *Streptopelia decaocto*: il 20 dicembre è stato notato un assembramento di almeno 50 ind. presso un cascinale a Monticelli d'Oglio (Verolavecchia); nell'area si riproducono regolarmente solo 2-4 coppie (Brichetti P.).

Gruccione *Merops apiaster*: nel tardo pomeriggio del 14 giugno vengono visti 2 ind. cacciare insetti in volo nei prati di Agnosine; il giorno seguente erano scomparsi. (Cucchi P., Micheli A., Rizzardini M.). E' la prima volta che la specie viene notata, in piena stagione riproduttiva, in una valle prealpina della provincia.

Torcicollo *Jynx torquilla*: udito i ind. in canto precoce il 5 marzo in località «Balosse» (colline moreniche della Valtenesi) a Moniga del Garda (Rossi A.).

Allodola golagialla *Eremophila alpestris*: 1 ind. di questa specie di comparsa accidentale (l'ultima segnalazione è stata effettuata nel 1964) è stato raccolto da un cacciatore a «Badia» di Pozzolengo nella prima metà di novembre (Rossi A.).

Beccofrusone *Bombycilla garrulus*: un gruppo di 25-30 ind. ha sostato da febbraio a fine marzo a Ponte di Legno in zone ricche di alberi di *Sorbus aucuparia* (Brichetti P.).

Pettazzurro *Luscinia svecica*: 1 ind. della sottospecie occidentale *cyaneola* rilevato il 24 marzo in un tifeto intermorenico presso Moniga del Garda; nello stesso sito la specie fu notata a fine agosto 1989 (Rossi A.).

Forapaglie *Acrocephalus schoenobaenus*: inconsueto il ritrovamento di un ind. morto, a Travagliato nel mese di dicembre, data molto tardiva (Ballerio G.).

Cannaiola *Acrocephalus scirpaceus*: rilevato 1 ind. in canto territoriale nella zona centrale della R.N. Torbiere di Iseo il 25 febbraio; la data decisamente atipica fa pensare ad un possibile svernamento della specie (Busetto M.).

Canapino maggiore *Hippolais icterina*: il 12 maggio 1 ind. in canto sommesso viene visto catturare un Tipulide in volo a Treviso Bresciano (Micheli A.). La specie è di transito regolare, tuttavia sporadiche restano le sue segnalazioni.

Occhiocotto *Sylvia melanocephala*: il soggetto rinvenuto morto il 12 dicembre, in un residuo boschetto pianiziale a Padernello (Borgo S. Giacomo), verosimilmente era un ind. erratico proveniente dai luoghi di riproduzione siti nelle oasi xerothermiche prealpine della provincia (Caffi M.).

Averla maggiore *Lanius excubitor*: il 18 gennaio osservato 1 ind. in una zona pianeggiante presso «Le Moie» a Rodengo Saiano (Maestri F., Voltolini L.). La specie nella nostra provincia transita regolarmente ma in numero limitato e principalmente nei mesi autunnali.

Cornacchia grigia *Corvus corone cornix*: a metà dicembre è stato trovato un dormitorio composto da circa 2000 ind. in un boschetto di pioppi lungo il f. Oglio presso Acqualunga; lo stesso sito era frequentato anche da 150 Corvi *Corvus frugilegus* e 3 Taccole *Corvus monedula* (Caffi M.).

Peppola *Fringilla montifringilla*: 1 ind. imbrancato con 4 Fringuelli *Fringilla coelebs*, nella zona sommitale del M. Stino l'8 aprile, data tardiva (Micheli A.).

Zigolo di Lapponia *Calcarius lapponicus*: l'avvistamento di 1 ind. a Clusane, il 18 ottobre, fa supporre la quasi regolarità della presenza autunnale della specie anche per il settore occidentale della provincia (Ballerio G.).

Zigolo minore *Emberiza pusilla*: 1 ind. imbrancato con Cardellini *Carduelis carduelis* e Lucarini *Carduelis spinus*, è stato raccolto in un cortile dell'abitato di Zone, il 15 ottobre (Pedrali A.). L'ultima segnalazione risale al novembre 1974 a Pozzolengo.