

RESOCONTO ORNITOLOGICO BRESCIANO 1991

Maurizio Busetto e Alessandro Micheli

Svasso cornuto *Podiceps auritus*: 1 ind., associato ad alcuni Svassi piccoli e Svassi maggiori, ha sostato alcuni giorni (dal 9 al 15 dicembre) nell'area portuale di Desenzano (Rossi A.). Di rilevante interesse lo stanziamento, l'anno precedente (dal 14 al 19 gennaio), di un altro ind. associato a due Svassi colorosso sulla sponda occidentale del lago d'Iseo, presso Tavernole Bergamasca (Busetto M., Baldi E.). La specie nella nostra provincia è molto rara ed irregolare e viene osservata quasi esclusivamente sul lago di Garda.

Tarabuso *Botaurus stellaris*: confermata l'importanza naturalistica della R. N. Torbiere d'Iseo per lo svernamento delle specie: 2 ind. osservati il 20 gennaio (Bertoli L., Leo R.) ed altri 2 il 23 novembre (Pedrali A.).

Nitticora *Nycticorax nycticorax*: 1 adulto ed 1 juv. sono stati osservati, posati su di un salice ai bordi delle vasche centrali della R. N. Torbiere d'Iseo, il 2 giugno (Busetto M.) (cfr. MICHELI e BUSETTO, 1992).

Garzetta *Egretta garzetta*: 2 ind. hanno sostato regolarmente da agosto fino al 2 dicembre sul greto del F. Chiese a monte del ponte tra Visano ed Acquafredda, nella bassa pianura bresciana (Gargioni A.); sosta prolungata probabilmente determinata dalle condizioni favorevoli del sito.

Moretta grigia *Aythya mania*: la specie viene segnalata, quasi annualmente, sul lago di Garda, dove sverna saltuariamente qualche individuo. Riportiamo le osservazioni effettuate da Rossi A. nella parte meridionale del lago presso Sirmione: 1 ind. associato a 11 Quattrocchi, il 15 febbraio; 2 ind. e 1 ind. assieme ad 8 Morette, l'8 marzo; 1 ind. il 24 marzo.

Orco marino *Melanitta fusca*: 23 ind. osservati il 15 gennaio presso Sirmione (Rossi A.). La comparsa di questo Anatide sembra più frequente rispetto al passato, in particolare sul lago di Garda (cfr. BRICHETTI e CAMBI, 1990).

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*: il 20 maggio, in un'ora di osservazione, contati 12 ind. in migrazione sopra Tremosine (Ghidotti B.).

Gipeto *Gypaetus barbatus*: 1 ind. di questa specie di comparsa accidentale in Lombardia, osservato il 2 novembre in volo radente sul M. Sasso Grande, nelle vicinanze del Passo di Dombastone (Gianni S.). Il soggetto, probabilmente un immaturo in dispersione, è verosimilmente uno degli individui reintrodotti negli ultimi anni nelle Alpi franco-svizzere e negli Alti Tauri (Austria).

Falco pellegrino *Falco peregrinus*: l'unica segnalazione si riferisce ad 1 ind. immaturo osservato in volteggio sopra un monte della media Vai Sabbia il 10 marzo (Micheli A.).

Gallina prataiola *Tetrax tetrax*: 1 ind. rinvenuto morto nell'aprile 1990 sotto le linee dell'alta tensione a Pozzolengo (Tacconi M.). La specie nel Bresciano è accidentale.

Piovanello *Calidris ferruginea*: 1 ind. osservato il 28 luglio a Manerba del Garda (Mazzotti S.). La specie, di comparsa scarsa, quantunque regolare e quasi esclusivamente nei mesi primaverili nella parte bassa del Garda, è stata segnalata anche nel settembre 1990 a Sirmione (cfr. MICHELI E BUSETTO, 1992).

Gabbiano comune *Larus nidibundus*: il censimento del 20 gennaio 1991 ha fornito i seguenti risultati:

Mignattino *Chlidonias nigen*: il 3 giugno (data tardiva) osservato 1 ind. in volo presso la riva del lago d'Idro, a Crone (Busetto M.).

Mignattino piombato *Chlidonias hybridus*: 1 ind. di questa specie, di comparsa rara e poco regolare nel Bresciano, osservato posato su di una boa a Rivoltella del Garda il 29 maggio (Busetto M.).

Gufi di palude *Asio flammeus*: osservato 1 ind. in un vigneto collinare a 270 m nella zona agricola di Nave, il 31 ottobre (Pedrali A.). Il 15 aprile un altro ind. è stato osservato, posato sui solchi di un campo arato nella

campagna di Montichiari (Pelizzari D.). Entrambe le osservazioni coincidono con il periodo migratorio che in provincia è da considerarsi scarso e poco regolare.

Succiacapre *Caprimulgus europaeus*: udito 1 ind. in canto territoriale il 10 aprile (data precoce) in un incolto presso Coccaglio (Pedrali A.).

Gruccione *Merops apiaster*: interessante l'osservazione di 14 ind. in volo su una zona collinare dell'entroterra gardesano, vicino a Lonato il 17 maggio (Piotti G., Rossi A.). La specie nel Bresciano è di transito scarso anche se regolare, soprattutto a primavera inoltrata.

Picchio cenerino *Picus canus*: osservato 1 ind., L'11 agosto, in un bosco misto a *Picea-Fagus* a 1500 m di quota nella Valle del Caffaro (Rizzardini M.).

Allodola golagialla *Eremophila alpestris*: osservato 1 ind. nel mese di novembre in un incolto presso Pozzolengo (Tacconi M.). La specie in Italia è di comparsa rara ed irregolare, soprattutto nei mesi autunnali e limitatamente alle regioni nord-orientali.

Rondine *Hirundo rustica*: osservati 2 ind. in volo sul lago d'Iseo l'1 gennaio presso Paratico (Mazzotti S.) ed altri 2, il 10 marzo presso Treviso Bresciano (Micheli A.). La specie è presente nella nostra provincia con arrivi anticipati fino da febbraio; nei mesi invernali, invece, la presenza, riferibile ad individui in sosta temporanea, è determinata soprattutto da condizioni climatiche favorevoli.

Calandro maggiore *Anthus novaeseelandiae*: 2 ind. di questa specie di comparsa rara ed irregolare osservati nel mese di ottobre a Pozzolengo (Tacconi M.).

Pettazzurro *Luscinia svecica*: determinato 1 ind. della sottospecie orientale svecica posato su di un cespuglio di *Salix* sp. il 12 settembre, presso il F. Chiese ad Acqua-fredda (Gargioni A.). Questa sottospecie è molto più rara ed irregolare di quella occidentale *cyaneula*.

Codirosso *Phoenicurus phoenicurus*: 1 ind. in canto territoriale il 27 marzo (data precoce) su di un tetto a Treviso Bresciano (Micheli A.).

Culbiano *Oenanthe oenanthe*: osservato 1 juv. in cerca di cibo in un campo di stoppie adiacente al F. Chiese, presso Acquafredda, il 25 ottobre (data tardiva). Il giorno 17, nello stesso sito erano presenti 2 ind. (Gargioni A.).

Salciaiola *Locustelia luscinioides*: 1 ind. in canto territoriale il 24 marzo (data precoce) nei canneti centrali della R. N. Torbiere di Iseo (Busetto M.).

Canapino maggiore *Hippobolus ictericus*: 1 ind. rilevato il 18 maggio in canto sommesso in una macchia di arbusti spinosi, nella campagna a Treviso Bresciano. L'anno precedente, in un luogo adiacente, un'analogha osservazione fu effettuata il 12 maggio (Micheli A.).

Luì verde *Phylloscopus sibilatrix*: 1 ind. posato il 9 ottobre (data tardiva) su di una bassa siepe, delimitante vasche per itticoltura presso Acquafredda (Gargioni A.).

Averla maggiore *Lanius excubitor*: l'osservazione di 1 ind. a Padernello, il 14 ottobre confermerebbe la presenza autunnale della specie (Pedrali A.).

Zigolo golarossa *Emberiza leucocephala*: 1 ind. osservato nel mese di novembre nella campagna a Pozzolengo (anfiteatro morenico del Garda) (Tacconi M.). La specie in provincia compare raramente ed in pianura occasionalmente.

Zigolo boschereccio *Emberiza rustica*: osservato 1 ind. nel mese di novembre a Pozzolengo (Tacconi M.). Di comparsa accidentale, nel Bresciano erano note solo due segnalazioni.