

## RESOCONTO ORNITOLOGICO BRESCIANO 1992

Maurizio Busetto e Arturo Gargioni

**Svasso collarosso** *Podiceps grisegena*: 1 ind. del primo anno ha sostato (dal 23 agosto al 3 settembre) presso un allevamento ittico a Calvisano (Gargioni A.). Occasionali sono le comparse al di fuori dei due maggiori laghi.

**Tarabuso** *Botaurus stellaris*: altre due segnalazioni di casi di svernamento per questa specie. 1 ind. il 25 gennaio a Punta Gro' (Sirmione) conferma lo svernamento regolare in questa zona. Un altro il 20 dicembre presso un allevamento ittico a Calvisano (Gargioni A.) (cfr. MICHELI e BUSETTO, 1991).

**Nitticora** *Nycticorax nycticorax*: la presenza della specie nella R. N. Torbiere d'Iseo, iniziata nel 1990 con la probabile estivazione di alcuni individui, sembra diventata regolare. 1 ind. adulto osservato il 22 maggio e 2 juv. e 1 adulto il 10 e il 13 luglio (Ballerio G.).

**Airone bianco maggiore** *Egretta alba*: 1 ind. osservato lungo il colatore Gambara tra gli abitati di Gambara e Fiesse il 27 agosto (Frigerio B.). La presenza della specie nella nostra provincia sembra diventata più regolare.

**Cicogna bianca** *Ciconia ciconia*: 5 ind. hanno sostato dal 2 al 7 aprile in località Soniga nel comune di Nuvolento. Segnalazioni di questa specie sono sempre più frequenti, anche per i nuovi insediamenti riproduttivi della padania occidentale.

**Mignattaio** *Plegadis falcinellus*: 1 juv. ha sostato il 20 ottobre in una tesa presso Pontoglio (Ballerio G.). Questa specie nella nostra provincia è considerata di comparsa molto scarsa ed irregolare.

**Fenicottero** *Phenicopterus ruber*: di comparsa accidentale con cinque segnalazioni in questo secolo. 1 ind. adulto ha sostato più di due settimane nel mese di maggio in una tesa perenne presso Bagnolo Mella (Brichetti P.).

**Anatra mandarina** *Aix gareliculata*: 1 fem. è stata catturata il 22 novembre in una tesa presso Rovato (Pedrali A.). Questa specie di origine asiatica si è acclimatata e si riproduce regolarmente allo stato selvatico da decenni in Europa occidentale, soprattutto nel sud-est dell'Inghilterra.

**Fistione turco** *Netta ruffina*: a riprova dell'incremento delle segnalazioni di questa specie in Italia settentrionale (cfr. BRICHETTI, 1982), 4 ind., 3 masc. e 1 fem., sono stati osservati l'8 marzo nelle Lamette della R. N. Torbiere del Sebino (Gargioni A., Bailo M., Vezzoli D., Mazzotti F., Mazzotti S.).

**Moretta tabaccata** *Aythya nyroca*: osservati 2 ind. in aprile e 1 ind. in settembre nelle «Lame» della R. N. Torbiere del Sebino (Mazzotti F. e Mazzotti S.). La specie nel bresciano risulta di comparsa poco regolare.

**Albanella reale** *Circus cyaneus*: probabile svernamento di 1 ind. in abito femminile osservato sul monte Puria, Val Tignalga (comune di Tignale) dal 16 gennaio al 5 marzo (Ghidotti B.). Della specie è noto un recente svernamento nelle alpi Orobie (cfr. Perugini, Bordonaro e Busetto, 1992).

**Sparviere** *Accipiter nisus*: il 14 ottobre presso Manerbio in una giornata di intenso movimento migratorio osservati posati su alberi 4 e successivamente 11 ind. di Sparviere (Bisetti 6.).

**Smeriglio** *Falco columbarius*: 1 ind. osservato presso un bosco ripariale lungo la roggia Savarona a Padernello nei giorni 27 e 28 dicembre (Caffi M.). Un altro ind. è stato osservato il 28 dicembre nella campagna a Coccaglio (Pedrali A.). Durante l'inchiesta per l'atlante degli svernanti 1985-88 è stata riscontrata una sola osservazione per tutto il periodo considerato.

**Lodolaio** *Falco subbuteo*: osservato 1 ind., in basso volo, il 7 agosto presso Cortefranca (Busetto M.). Il 17 settembre 1 ind. è stato osservato nella R. N. Torbiere del Sebino (Pedrali A.). La specie nell'Italia settentrionale presenta una distribuzione alquanto frammentaria in quanto sono noti recenti casi di riproduzione solo nel Milanese e nel Pavese.

**Gru** *Grus grus*: osservati 11 ind. in volo migratorio il 16 marzo a Punta S. Vigilio di Sirmione (Mutti G.). È la seconda segnalazione di un gruppo consistente, di questa specie considerata di comparsa rara e irregolare nel Bresciano (cfr. BUSETTO e GARGIONI, 1988).

**Combattente** *Philomachus pugnax*: 1 ind. masc. inanellato a Eernewoude (Frisland) in Olanda il 28 aprile 1989 è stato catturato presso Bagnolo Mella il 27 marzo (Brichetti P.).

**Gabbiano tridattilo** *Rissa tridactyla*: degna di nota l'osservazione di 1 ind., il 13 ottobre a Clusane di Iseo (Mazzotti S.). La specie, prettamente pelagica, risulta di comparsa rara e irregolare nell'entroterra.

**Rondone pallido** *Apus pallidus*: osservato 1 ind. il 16 settembre in volo in uno stormo misto comprendente Rondini (*Hirundo rustica*) e Balestrucci (*Delichon urbica*), lungo il F. Chiese presso Mezzane a Calvisano (Gargioni A.). Rara ed irregolare la comparsa della specie (quarta segnalazione) che verosimilmente in natura viene confusa con il Rondone (*Apus apus*).

**Picchio verde** *Picus viridis*: osservato 1 ind. in volo il 10 dicembre e successivamente il 15 febbraio 1993 nell'abitato di Verolanuova in una zona con parchi urbani e argini boscati del F. Strone (Caffi M.). Probabilmente lo stesso individuo sentito ripetutamente verso la metà di marzo in un parco urbano a Verolavecchia (Brichetti P.). Questo Picchio, ormai scomparso dalla pianura, in provincia è sedentario e nidificante solamente nelle zone collinari e nei boschi misti di montagna tra i 400 e i 1600-1700 m. Le osservazioni in pianura sono da considerarsi eccezionali.

**Cappellaccia** *Galerida cristata*: una notevole concentrazione di 25-30 ind. è stata notata regolarmente dal 15 dicembre al 15 gennaio 1993 in alimentazione presso marcite vicino a Padernello (Caffi M.). Nella stessa zona erano presenti regolarmente nello stesso periodo circa un centinaio di Pispole (*Anthus pratensis*) e Spioncelli (*Anthus spinoletta*).

**Rondine rossiccia** *Hirundo daurica*: decisamente interessante l'osservazione di 2 ind., il 14 maggio, in volo sul monte Procalvis tra i comuni di Toscolano Maderno e Gargnano (Cucchi P., Mutti G., Rossi A.). Prima segnalazione per la provincia.

**Beccofrusone** *Bombus garrulus*: 1 ind. di questa specie di comparsa irregolare a seguito di invasioni autunno-invernali, è stato osservato isolato il 13 gennaio in ambiente collinare presso Gussago (Ballerio G.).

**Canapino maggiore** *Hippoboscus icterina*: 1 ind. masc. in canto udito in una piccola cava con *Salix alba* e *Populus nigra* sulle sponde del F. Chiese a Calvisano il 24 maggio (Gargioni A.). In provincia le precedenti segnalazioni di questo silvide si riferiscono al settore alpino (cfr. BRICHETTI, 1982; Micheli e Busetto, 1990 e 1991).

**Nocciolaia** *Nucifraga caryocatactes*: 1 ind. è stato osservato il 10 gennaio, in periodo di svernamento, sul M. Orfano (Pedrali A.). Rare sono le segnalazioni nel settore collinare e in pianura di questa specie.

**Taccola** *Corvus monedula*: interessante osservazione di 1 ind. posato su di un'antenna televisiva nel centro storico di Castegnato, il 26 maggio (Busetto M.). La specie in provincia si riproduce con un numero limitatissimo di coppie a Borgo 5. Giacomo, Palazzolo e Sirmione.

**Frosone** *Coccothraustes coccothraustes*: numericamente eccezionale il transito della specie sui valichi prealpini dalla fine di settembre alla prima decade di novembre. In alcune località montane sono transitati centinaia di stormi in successione. Il 9 ottobre è stato contato circa un migliaio di individui sorvolare un valico in Val Sabbia (Micheli A.).