

## RESOCONTO ORNITOLOGICO BRESCIANO 2000

Arturo Gargioni e Marco Guerrini

### ELENCO DEI COLLABORATORI

Hanno contribuito a questo resoconto, comunicando le loro osservazioni: Mauro Bailo (Sale Marasino), Renzo Baratti (Barbariga), Giuseppe Barezzani (Verolavecchia), Roberto Barezzani (Brescia), Roberto Bertoli (Torbole Casaglia), Michele Boglioni (Cortefranca), Giuseppe Brognoli (Verolavecchia), Maurizio Elia Busetto (Corticelle di Dello), Mario Caffi (Motella di Borgo S. Giacomo), Roberto Cantaboni (Manerbio), Stefania Capelli (Bovezzo), Gianbattista Compagnoni (Bedizzole), Giancarlo Comincioli (Tremosine), Renato Frassine (Cellatica), Roberto Garavaglia (Milano), Arturo Gargioni (Gottolengo), Marco Gobbini (Paitone), Marco Guerrini (Provaglio d'Iseo), Donatella Lampugnani (Gottolengo), Rocco Leo (Collebeato), Danilo Lombardi (Bedizzole), Fausta Lui (Modena), Marco Mastroilli (Boltiere, BG), Alessandro Micheli (Treviso Bresciano), Roberto Migliorati (Pavone del Mella), Attilio Mutti (Desenzano del Garda), Livio Pagliari (Orzinuovi), Dario Quaranta (Manerbio), Rossano Quirini (Paderno Franciacorta), Alessandro Rossi (Desenzano), Gianluigi Sguazzi (Paderno Franciacorta), Maurizio Sighele (Verona), Corpo Forestale dello Stato (stazione di Edolo).

---

\* G.R.A., Gruppo Ricerca Avifauna

### ELENCO SISTEMATICO DELLE SEGNALAZIONI

#### GAVIIDAE

**Strolaga minore** Gavia stellata: un ind. osservato dal 06 al 17 gennaio a Vello di Marone sul lago d'Iseo (M. Sighele, M. Bailo, R. Garavaglia). Sempre scarse in provincia, le segnalazioni di questa specie.

#### ARDEIDAE

**Tarabuso** Botaurus stellaris: dieci individui osservati il 17 e il 18 marzo in raggruppamento trofico serale nella R.N. Torbiere del Sebino (R. Bertoli, M. Caffi e R. Leo). Per la provincia è considerato migratore e svernante regolare con un numero ridotto di individui; dal 1999 nel comprensorio delle Torbiere del Sebino ha mostrato un notevole incremento degli effettivi svernanti (BOGLIONI & LEO in stampa) e migranti.

**Airone guardabuoi** Bubulcus ibis: a conferma di una marcata espansione territoriale nella nostra provincia sono stati osservati 6 ind. in alimentazione in campi arati dal 23 gennaio al 18 febbraio fra Roncadelle, Castegnato e Rodendo Saiano, 47 IV SE (L. Rocco, M. Guerrini); due ind. presenti il 25 gennaio a Corte Franca, 47 IV NO (M. Guerrini), uno il 05 febbraio nella R.N. Torbiere del Sebino (M. Sighele); il 28 dicembre osservati due ind. in alimentazione in un campo di stoppie presso Solaro in comune di Gottolengo, 47 II SO (A. Gargioni) ed uno a Roncadelle dal 28 al 31 dicembre (M. Guerrini, G. Sguazzi). Inoltre 4 individui hanno regolarmente svernato per tutto il mese di dicembre presso Padernello di Borgo S. Giacomo, 47 III SO (M. Caffi).

**Airone bianco maggiore** Cosmerodius albus: un ind. osservato in riposo in un canneto il 26 settembre a Rivoltella di Desenzano (A. Gargioni), prima segnalazione della specie per il Lago di Garda in tempi recenti. Osservati inoltre: 1 ind. in volo il 18 marzo nella R.N. Torbiere del Sebino (L. Rocco), 1 ind. l'11 agosto in atteggiamento trofico nel fiume Chiese a Bedizzole (D. Lombardi), 3 ind. il 7 settembre a Fiesse lungo il colatore Gambara (A. Gargioni). Tre ind. hanno sostato dal 1 al 20 settembre in una tesa a Bagnolo Mella (R. Baratti), 4 ind. osservati in volo il 2 novembre a Castelletto di Leno (D. Lampugnani). Infine 1 ind. in volo il 12 novembre sopra il fiume Oglio nella R.N. Bosco di Bargo a Orzinuovi (A. Gargioni, D. Quaranta, G. Barezzani, R. Cantaboni). Anche per questa specie viene confermata una regolarità delle presenze migratorie e invernali.

#### CICONIIDAE

**Cicogna nera** Ciconia nigra: un ind. osservato in migrazione il 27 agosto a Pozzolengo (A. Gargioni, M. Busetto). Negli ultimi anni le osservazioni appaiono più regolari, anche se riguardano un numero ancora esiguo di individui.

**Cicogna bianca** Ciconia ciconia: un ind. ha sostato sul campanile di Edolo e nei prati adiacenti dal 26 al 28 gennaio; sulla zampa sinistra portava un anello con dicitura: France 1702 C.R.B.O. (Corpo Forestale dello Stato, sez. di Edolo). Il soggetto risulta inanellato da pullus il 5 agosto 1991 a Kintzheim in Francia dal C.R.B.O. Strasbourg (dati I.N.F.S.). Primo caso accertato di presenza invernale per la provincia.

#### PHOENICOPTERIDAE

**Fenicottero** Phoenicopus roseus: un ind. il 20 marzo in volo e successivamente posato per una breve sosta nella R.N. Torbiere del Sebino (L. Pagliari); un secondo ind. era presente dal 23 al 25 settembre e successivamente l'1 ottobre in una tesa a Verolavecchia (G. Brognoli). Di comparsa accidentale per la nostra provincia, con l'ultima segnalazione risalente al 1992 (BUSETTO e GARGIONI 1994).

#### ANATIDAE

**Fistione turco** Netta rufina: osservati 67 ind. il 17 gennaio durante il censimento invernale, a conferma del notevole aumento del contingente svernante su questo bacino lacustre (A. Rossi, A. Gargioni). Un maschio visto il 28 febbraio nella R.N. Torbiere del Sebino (M. Guerrini). Trattasi presumibilmente di un individuo in migrazione precoce.

**Moriglione** Aythya ferina: a riconferma della nidificazione della specie nella R.N. delle Torbiere del Sebino (GUERRINI in GARGIONI e PEDRALI in stampa), osservate ripetutamente due femmine fra maggio e giugno con rispettivamente 4 e 3 pulli (M. Guerrini).

**Moretta grigia** Aythya marila: un maschio adulto osservato dal 16 gennaio al 10 febbraio, imbrancato a Morette Aythya fuligula e Moriglioni Aythya ferina, nella R.N. Torbiere del Sebino (M. Guerrini). L'eccezionale numero di individui del genere Aythya svernanti nella Riserva, stimabile in un migliaio, è sicuramente dovuto all'ondata di freddo che ha reso indisponibili altri siti abituali di svernamento.

**Quattrocchi** Bucephala clanga: presenti fino ad un massimo di 6 ind. dal 27 gennaio al 20 febbraio nella R.N. Torbiere del Sebino, a conferma di un regolare svernamento in questa zona umida (M. Guerrini, M. Sighele, F. Lui, M. Mastrorilli, R. Frassine, R. Bertoli).

**Moretta codona** Clangula hyemalis: 4 ind. osservati al lago di Peschiera il 16 gennaio (A. Gargioni, A. Rossi) e un individuo in alimentazione vicino al porto di Padenghe il 23 gennaio (A. Gargioni). Di comparsa scarsa ed irregolare, le poche segnalazioni avvengono esclusivamente sul lago di Garda.

**Smergo maggiore** Mergus merganser: una femmina presente dal 17 gennaio al 5 febbraio (R. Garavaglia, M. Sighele) e il 12 febbraio (R. Frassine), sul lago d'Iseo in località Vello di Marone, 34 III SE. Sempre scarse ed irregolari le segnalazioni di questa specie che è considerata svernante irregolare per la provincia.

- Tab. 1 – Elenco sistematico degli uccelli acquatici (compresi Phalacrocorax carbo e Ardea cinerea) censiti nel gennaio 2000 nei maggiori bacini lacustri bresciani. I valori per il lago di Garda comprendono anche quelli relativi agli individui censiti nelle provincie di Verona e Trento
- Rilevatori Lago d'Iseo: M. Bailo; G. Ballerino; P. Brichetti.; E. Boniotti e M. Guerrini.
- Rilevatori Lago di Garda: A. Gargioni, A. Rossi e G. Barezani

Specie	Lago di Garda	Lago d'Iseo	Torbiere d'Iseo
Strolaga minore		1	
<u>Gavia stellata</u>			
Strolaga mezzana	8		

<a href="#">Gavia arctica</a>			
Tuffetto	81	5	
<a href="#">Tachybaptus ruficollis</a>			
Svasso maggiore	1889	830	30
<a href="#">Podiceps cristatus</a>			
Svasso collarosso	1		
<a href="#">Podiceps grisegena</a>			
Svasso piccolo	4811	3	
<a href="#">Podiceps nigricollis</a>			
Cormorano	496	31	280
<a href="#">Phalacrocorax carbo</a>			
Tarabuso	1		3
<a href="#">Botaurus stellaris</a>			
Airone cenerino	32		
<a href="#">Ardea cinerea</a>			
Cigno reale	207	93	5
<a href="#">Cygnus olor</a>			
Canapiglia			4
<a href="#">Anas strepera</a>			
Alzavola			21
<a href="#">Anas crecca</a>			
Germano reale	375	59	20
<a href="#">Anas platyrhynchos</a>			
Mestolone			23
<a href="#">Anas clypeata</a>			
Fistione turco	67		
<a href="#">Netta rufina</a>			
Moriglione	1153		600
<a href="#">Aythya ferina</a>			
Moretta	371		300
<a href="#">Aythya fuligula</a>			
Moretta grigia	3		1
<a href="#">Aythya marila</a>			
Moretta codona	4		
<a href="#">Clangula hyemalis</a>			
Quattrocchi	6		2
<a href="#">Bucephala clangula</a>			
Pesciaiola			2
<a href="#">Mergellus albellus</a>			

Smergo maggiore		1	
<u>Mergus merganser</u>			
Folaga	16104	32	19
<u>Fulica atra</u>			

#### ACCIPITRIDAE

**Falco pecchiaiolo**, Pernis apivorus: il 2000 ha fornito per la Provincia di Brescia una prima stima del flusso migratorio sia primaverile che autunnale di questa specie. Dopo alcuni anni di sperimentazione, la Cima Comèr in comune di Gargnano a 1279 m s.l.m., per quanto riguarda la migrazione primaverile e le colline moreniche del Lago di Garda in comune di Pozzolengo a 115 m s.l.m., per quella autunnale, hanno dato i seguenti risultati: Cima Comèr per otto giorni consecutivi e circa quaranta ore di osservazione censiti in totale 480 individui con direzione prevalente di migrazione WSW – NE (R. Bertoli red.); a Pozzolengo in due giorni non consecutivi e dodici ore di osservazione, censiti complessivamente 878 individui con direzione prevalente di migrazione NE – SW (A. Gargioni red.). Di doppio passo regolare e nidificante, i contingenti migratori non sono mai stati quantificati e le segnalazioni riguardanti la migrazione attraverso la nostra provincia sono state fino ad ora sparse e discontinue.

#### FALCONIDAE

**Falco pellegrino** Falco peregrinus: un individuo ha svernato dalla metà di dicembre fino alla fine di febbraio dell'anno successivo nel centro urbano di Motella di Borgo S. Giacomo, 47 III SO, usando le mura del castello come posatoio (M. Caffi). Un maschio e una femmina immaturi sono inoltre stati catturati e inanellati, rispettivamente il 19 settembre e il 17 ottobre nella stazione di inanellamento del Passo dello Spino in comune di Toscolano Maderno (A. Micheli). Sempre più regolari le segnalazioni di questa specie soprattutto in periodo invernale e in pianura.

#### PHASIANIDAE

**Quaglia** Coturnix coturnix: due maschi uditi in canto l'8 luglio nei pascoli pingui delle praterie umide alpine rispettivamente a 1800 m ed a 2000 m. in località Dossi di Cadino, 34 I NE (A. Micheli). In provincia risulta più diffusa in pianura, nei fondovalle e sui rilievi collinari e prealpini.

#### GRUIDAE

**Gru** Grus grus: un giovane ha sostato da metà febbraio al 12 marzo in una tesa per anatidi presso la cascina Rezzata, in località Macine di Castenedolo (R. Bertoli, G. Compagnoni, M. Gobbin). Trattasi presumibilmente di un migratore precoce.

#### RECURVIROSTRIDAE

**Cavaliere d'Italia** Himantopus himantopus: a riconferma della nidificazione della specie, sei coppie hanno iniziato la deposizione nella tesa da caccia presso la cascina Campagna di Pavone del Mella (GARGIONI e PEDRALI 2000), ma solo una ha portato a termine la nidificazione con tre pulli involati, a causa presumibilmente della predazione dei nidi da parte di Cornacchie grigie Corvus corone cornix e Aironi cenerini Ardea cinerea (R. Migliorati). A conferma di una sempre maggiore presenza di questa specie, 19 individui hanno sostato l'ultima settimana di luglio in una tesa per anatidi presso Faverzano (R. Baratti).

#### LARIDAE

**Gabbianello** Larus minutus: un gruppo di 38 individui per l'80% giovani sono stati osservati il 26 settembre alimentarsi sulle acque del Lago di Garda in località Punta Grò (A. Gargioni). Nella stessa località il 5 novembre erano presenti 11 individui (A. Rossi, A. Gargioni). Di questa specie migratrice regolare vengono di solito osservati individui singoli o piccoli gruppi.

**Gabbianello** Larus minutus: un gruppo di 38 individui per l'80% giovani sono stati osservati il 26 settembre alimentarsi sulle acque del Lago di Garda in località Punta Grò (A. Gargioni). Nella stessa località

il 5 novembre erano presenti 11 individui (A. Rossi, A. Gargioni). Di questa specie migratrice regolare vengono di solito osservati individui singoli o piccoli gruppi.

**Zafferano** Larus fuscus: 2 ind. osservati il 16 gennaio posati sul ghiaccio associati ad altri laridi e uno il 2 febbraio, nella R.N. Torbiere del Sebino (M. Guerrini). Svernante regolare per il Lago di Garda, sembra ormai regolare anche sul Sebino.

**Gabbiano reale** Larus chachinnans: osservati 2 ind. in accoppiamento il 13 aprile nella R.N. Torbiere del Sebino (S. Capelli), dove mancano però prove certe della nidificazione. Un ind. osservato in volo il 21 maggio sul Lago d'Idro (A. Micheli), dove gli avvistamenti sono rari ed esclusivamente invernali.

- Tab. 2 – Risultati del censimento dei Laridi svernanti in provincia di Brescia effettuato il 23 gennaio 2000 (per il lago di Garda i valori comprendono anche la provincia di Verona, mentre il Lago d'Idro non è stato rilevato).
- Rilevatori Lago d'Iseo: R. Bertoli; M. Boglioni; M. Caffi; S. Capelli e R. Leo.
- Rilevatori Lago di Garda: M. Allegri; G. Barezzi; G.B. Compagnoni; A. Gargioni; D. Lampugnani e A. Rossi.

Specie	Località	Ind. Stazionari	Ind. al rientro serale
Gabbiano comune	L. di Garda	1894	14540
<u>Larus ridibundus</u>	L. d'Iseo		23211
Gabbiano reale	L. di Garda	197	
<u>Larus cachinnans</u>	L. d'Iseo		
Gavina	L. di Garda	360	
<u>Larus canus</u>	L. d'Iseo		
	<b>Totale</b>	2451	37751

## COLUMBIDAE

**Tortora dal collare** Streptopelia decaocto: un individuo completamente albino visto per alcuni giorni alla fine di ottobre alimentarsi nei giardini del centro abitato di Sale Marasino (A. Bailo). Per la provincia non sono noti casi di albinismo.

## STRIGIDAE

**Civetta nana** Glaucidium passerinum: una femmina immatura catturata e inanellata il 17 ottobre presso la stazione di inanellamento della Regione Lombardia del Passo dello Spino a 1180 m s.l.m., in comune di Toscolano Maderno (A. Micheli). E' probabilmente la segnalazione più meridionale nella nostra provincia di questa specie boreoalpina, dopo gli anni '930 (DUSE 1931d).

**Gufo comune** Asio otus: osservati 3 giovani non volanti nel mese di giugno in un boschetto di Roverella a Cortefranca (M. Boglioni). Accertata la nidificazione nella tavoletta 47 IV NO. Un adulto era stato più volte osservato anche nella precedente stagione riproduttiva.

## PICIDAE

**Picchio verde** Picus viridis: un individuo sentito in canto il 30 dicembre nella R.N. Isola dell'Uccellanda, comune di Villachiaro, 46 II NO (R. Bertoli). Dopo le segnalazioni di Brichetti e Caffi per Verolanuova e Verolavecchia (BUSETTO e GARGIONI 1994), è questo il secondo sito di pianura dove la specie viene contattata, a dimostrare una lenta ma progressiva ricolonizzazione degli areali storici.

## HIRUNDINIDAE

**Rondine** Hirundo rustica: ulteriori casi di migrazione tardiva e di svernamento hanno interessato la provincia. Due individui il 25 ottobre posati su cavi dell'illuminazione a Paderno F.C., uno solo ancora presente il 4 novembre (R. Quirini). Il 12 dicembre un individuo in abito giovanile osservato in volo a Sirmione (R. Leo).

#### TURDIDAE

**Codirosso spazzacamino** Phoenicurus ochruros: il 20 giugno un maschio adulto osservato nel centro abitato di Chiari, 146 m s.l.m., in prossimità dell'ospedale e di un parco patrizio, 46 I SE. Altri maschi erano presenti fino a metà luglio in luoghi diversi del perimetro urbano (R. Barezzani). La specie è legata agli ambienti montani, ma sembra continuare la colonizzazione delle zone basso collinari e pianeggianti, come riscontrato lo scorso anno a Verolanuova (PISTOLESI in GARGIONI e PEDRALI in stampa).

#### SYLVIIDAE

**Beccamoschino** Cisticola juncidis: accertata la nidificazione della specie in un prato arido con una limitata zona umida in località Vallio di Desenzano (48 III NE), a 130m s.l.m. Sentito in canto il 18 maggio e successivamente, il 23 luglio osservati tre pulli imbeccati dai genitori (A. Mutti). Precedentemente era dato come nidificante probabile (Rossi in BRICHETTI 1992).

**Bigia grossa** Sylvia hortensis: un maschio in canto prolungato è stato contattato il 17 maggio in prati da sfalcio con alberi da frutto in località Dusina nel comune di Vobarno (35 III SO), a 776 m s.l.m. (A. Micheli). In precedenza la specie risultava nidificante possibile (BRICHETTI e CAMBI 1985).

**Lui piccolo** Phylloscopus collybita: nuova cattura il 17 marzo in occasione della campagna di inanellamento effettuata nella R.N. Torbiere del Sebino, di un individuo della sottospecie siberiana tristis. Le misure biometriche erano le seguenti: terza remigante 48 mm, ala 64 mm, peso 7,8 g., è stato inanellato con un anello metallico INFS, XA 0854 (R. Bertoli). Con la precedente cattura di un altro individuo in periodo autunnale nella stessa località (Leo in GARGIONI e PEDRALI in stampa), si può ipotizzare per le Torbiere del Sebino un transito regolare durante la migrazione pre e post riproduttiva. Ulteriori controlli potrebbero portare anche alla scoperta di individui svernanti.

#### PARIDAE

**Cincia dal ciuffo** Parus cristatus: un ind. osservato su un platano il 3 febbraio nella R.N. Torbiere del Sebino (M. Mastrorilli), un'altro il 27 giugno in canto a Vello di Marone sul lago d'Iseo a 193 m s.l.m. (M. Guerrini), altitudine insolita per questa specie che viene solitamente rilevata fra i 1100 e i 1700 m. Si ricorda l'avvenuta nidificazione in un bosco della provincia a 250 m s.l.m. (GARGIONI e PEDRALI in stampa).

#### CORVIDAE

**Taccola** Corvus monedula: osservati alcuni individui (max. 5) in periodo riproduttivo presso l'ospedale di Chiari (46 I SE), mentre il 10 novembre gli individui presenti erano due, la specie è presente in loco da almeno tre anni (R. Barezzani). Accertata la nidificazione di 1 – 2 coppie sul campanile della chiesa parrocchiale di Villa (sede comunale di Villa Carcina), 47 I NO (R. Quirini). Prosegue in provincia la graduale colonizzazione di questa specie. Tre individui aggregati a Cornacchie grigie Corvus corone cornix osservati il 21 ottobre in attività trofica in un campo presso Gussago (M. Guerrini). Tali presenze potrebbero in futuro determinare l'insediamento di nuove colonie.

**Cornacchia nera** Corvus corone corone: un ind. in pastura in un prato a Roncadelle il 17 ottobre, uno il 5 e 2 il 12 novembre in volo nella R.N. Torbiere del Sebino (M. Guerrini). Viene riconfermato per le Torbiere del Sebino il limite altitudinale più basso di osservazione di questa sottospecie tipica delle zone montane (BRICHETTI e CAFFI in GARGIONI e PEDRALI 1998).

#### FRINGILLIDAE

**Venturone** Serinus citrinella: due maschi immaturi sono stati inanellati l'1 novembre presso la stazione di inanellamento del Passo dello Spino in comune di Toscolano Maderno. Inoltre il 27 ottobre un piccolo

gruppo osservato in volo con direzione E - W, presso il passo della Berga in comune di Bagolino (A. Micheli). Viene confermato nella fascia prealpina il transito scarso ma regolare di questo fringillide.

**Ciuffolotto scarlatto** Carpodacus erythrinus: un individuo maschio catturato con altri fringillidi il 18 ottobre in una rete illegale posta in un campo di mais in località Campielli, in comune di San Felice del Benaco (G. Comincioli). La specie è in progressiva espansione verso l' Europa occidentale. L'ultima segnalazione per la provincia di Brescia risale al 1994 (MICHELI in GARGIONI e PEDRALI 1998)

#### EMBERIZIDAE

**Zigolo nero** Emberiza cirius: un maschio in canto udito il 10 maggio a 850m s.l.m., all'interno di una boscaglia termofila rada alla base del versante sud della Corna di Savallo, 34 II SO (A. Micheli) dove, in un precedente studio la specie non era stata contattata (CAMBI e MICHELI 1986). In base ai risultati dell'Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (BRICHETTI e CAMBI 1985) risulta nidificante localizzato con poche coppie nei settori prealpini secchi e soleggiati, compresi tra i 200 e i 500 m.

#### BIBLIOGRAFIA

- BRICHETTI P., 1992 - Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Brescia (Lombardia). Aggiunte 1985-1991. Natura Bresciana, 27: 201 - 221
- BRICHETTI P. e CAMBI D., 1985 - Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Brescia (Lombardia) 1980 – 1984. Monografie di "Natura Bresciana", 8: 142 pp.
- BUSETTO M. e GARGIONI A., 1994 – Resoconto ornitologico bresciano 1992. Natura Bresciana, 29: 287 – 292.
- CAMBI D. e MICHELI A., 1986 – L'avifauna nidificante della "Corna di Savallo" (Prealpi Bresciane, Lombardia): censimento e ecologia. Natura Bresciana, 22: 103 – 178.
- DUSE A., 1931d. Dall'osservatorio Ornitologico del Garda. Riv. ital. Orn. 1: 185-190
- GARGIONI A. e PEDRALI A., 1998 – Resoconto ornitologico bresciano 1994. Natura Bresciana, 31: 249 – 258.
- GARGIONI A. e PEDRALI A., 1998 – Resoconto ornitologico bresciano 1995. Natura Bresciana, 31: 259 – 268.
- GARGIONI A. e PEDRALI A., 2000 – Resoconto ornitologico bresciano 1998. Natura Bresciana, 32: 241 – 248.
- GARGIONI A. e PEDRALI A., Resoconto ornitologico bresciano 1999. Natura Bresciana, in stampa.