

ARTURO GARGIONI\* e MARCO GUERRINI\*

## RESOCONTO ORNITOLOGICO BRESCIANO 2004

\* Gruppo Ricerche Avifauna

*Parole chiave* – Segnalazioni ornitologiche, provincia di Brescia

**RIASSUNTO** – Vengono accorpate, divise per anno, le segnalazioni ornitologiche più interessanti per la provincia di Brescia relative al periodo 2004. Sono esclusi i dati già pubblicati su riviste specializzate. In Appendice vengono riportate alcune segnalazioni inedite relative al 2003.

*Key words* – Ornithological report, province of Brescia.

**SUMMARY** – 2004 ornithological report for the province of Brescia (Northern Italy). This report considers the more interesting ornithological record of 2004 and 2005. The information already published in other scientific journal are not reported. In appendice are reported non published data regarding 2003.

### PREMESSA

I criteri adottati per vagliare le osservazioni sono i seguenti:

- specie accidentali, rare o comunque poco osservate nel territorio bresciano, anche solo in relazione a determinati periodi dell'anno;
- specie comuni, ma presenti in un dato momento in quantità non consueta;
- soggetti che presentano comportamenti poco noti o anomalie del piumaggio;
- soggetti inanellati;
- casi di nidificazione di specie rare o localizzate, rilevati successivamente all'Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (1980-1984) e relativo aggiornamento (1985-1991).

Non sono state prese in considerazione le notizie già pubblicate su riviste del settore.

Ricordiamo ai collaboratori di fare riferimento, per la valutazione dei propri dati, al lavoro sulla "Situazione dell'avifauna bresciana" (BRICHETTI 1994) ed alla "Check-list della provincia di Brescia aggiornata al 1999" (BRICHETTI e GARGIONI 2003). Inoltre, ai fini della pubblicazione, è utile fornire un'eventuale documentazione fotografica delle osservazioni più interessanti.

Vengono considerate in un'appendice, anche le specie esotiche (fuggite dalla cattività), osservate in provincia di Brescia, nonché alcune segnalazioni inedite relative agli anni precedenti.

La classificazione e nomenclatura sono in accordo con la recente Lista degli uccelli italiani CISO COI.

### ELENCO DEI COLLABORATORI

Nicola Anni (Manerbio), Davide Ardigò (Navazzo di Gargnano), Mauro Bailo (Sale Marasino), Giuseppe Barbieri (Casalmoro, MN), Leonardo Beghellini (Brescia), Roberto Bertoli (Brione di Gussago), Roberto Bonetti (Gussago), Ermanno Bollin (Brescia), Enrico Bresciani (Brescia), Pierandrea Brichetti (Verolavecchia), Mario Caffi (Motella di Borgo S. Giacomo), Stefania Capelli (Bovezzo), V. Coltrini ( ), Gianbattista Compagnoni (Bedizzole), Pieralberto Cucchi (Barghe), Angelo Danesi (Iseo), Antonio Delle Monache (Milano), Giorgio Feroldi (Brescia), A. Foglio ( ), Arturo Gargioni (Gottolengo), E. Ghidoni (S. Colombano), Marco Gobbini (Paitone), Nunzio Grattini (Pegognaga, MN), Marco Guerrini (Provaglio d'Iseo), F. Lamberti (Gussago), Rocco Leo (Collebeato), Alessandro Micheli (Treviso bresciano), Guido

Parmeggiani (Sirmione), Angelo Pasqua (Salò), Stefano Pirola (Lonato), Alessandro Rossi (Desenzano), L. Scalvini ( ), Alba Sguazzi (Paderno F.C.), Mario Tosoni (Cigole).

## ANNO 2004

### ANATIDAE

**Mestolone** *Anas clipeata*: femmina con tre pulli al seguito osservata il 4 aprile in zona Lamette nella R.N. Torbiere del Sebino 47 IV NO (R. Bonetti). Prima nidificazione accertata della specie per la Riserva. Nelle vicinanze era presente un'altra coppia, alla quale successivamente si sono aggregati altri 12 ind. provenienti in volo dal lago.

### PHALACROCORACIDAE

Data rilevamento	Località	Numero individui
11 gennaio 2004	Lago d'Iseo e torbiere	490
11 gennaio 2004	Lago di Garda	699
11 gennaio 2004	Lago d'Idro	67
22 gennaio 2004	Monticelli d'Oglio (Fiume Oglio)	122
	TOTALE	1378

Tab. 1 - **Cormorano** *Phalacrocorax carbo* : risultati 2004 del censimento provinciale ai dormitori.  
Rilevatori: A. Gargioni, D. Quaranta, N. Anni, M. Guerrini, A. Micheli

### ARDEIDAE

**Airone guardabuoi** *Bubulcus ibis*: numerose osservazioni invernali di vari individui in tutta la bassa pianura ed il basso Garda, con un massimo di 35 ind. il 12 marzo a Torchiera di Pontevico; di seguito i paesi con i rispettive tavolette IGM delle segnalazioni invernali: Castelletto e Cereto di Leno 47 II SO, Manerbio, Calvisano 47 II SE, Seniga 61 IV SE, Verolanuova, Torchiera di Pontevico, Pontevico, Cigole, Milzano 61 IV NE, Gottolengo, Gambara 61 I NO, Fiesse 61 I SO, Cadimarco di Fiesse 61 I SE, Acquafredda 61 I NE, Cremezzano, Coniolo di Orzinuovi, Borgo San Giacomo 47 III SO, Rivoltella del Garda, Desenzano 48 III NO, Bagnolo Mella 47 III NE (A. Gargioni, D. Lampugnani, D. Quaranta, N. Anni, S. Pirola, M. Bailo, E. Bresciani, M. Caffi ).

**Garzetta** *Egretta garzetta*: 1 ind. osservato il 3 gennaio in un campo arato, aggregato ad aironi cenerini e gabbiani comuni presso il fiume Chiese, 61 I NE; un altro il 12 dicembre imbrancato con aironi guardabuoi in un campo di stoppie di mais presso Gambara 61 I NO (A. Gargioni). Per la provincia la specie è considerata svernante irregolare.

**Airone bianco maggiore** *Casmerodius albus*: a conferma di una regolare presenza invernale nella nostra provincia, 1 ind. il 4 gennaio (R. Bertoli, D. Quaranta) e 2 ind. il 22 gennaio (R. Bertoli, A. Gargioni) a Monticelli d'Oglio 61 IV NO; 1 ind. il 5 gennaio in alimentazione presso un canale a Seniga 61 IV SE (N. Anni); uno ai margini di un campo arato il 13 gennaio presso S. Gervasio Bresciano (D. Lampugnani) ed un altro in alimentazione in un campo arato il 25 gennaio ad Alfianello 61 IV NE (N. Anni, A. Gargioni, D. Quaranta); uno in volo sopra Gottolengo il 9 febbraio 61 I NO (A. Gargioni), un altro dall'1 al 6 marzo a Verolavecchia (D. Quaranta); uno il 4 marzo in volo dal lago verso Rivoltella di Desenzano del Garda (A. Gargioni, D. Lampugnani); un altro a Manerbio, il 15 marzo (N. Anni); uno il 27 maggio nella R.N. Torbiere del Sebino (M. Bailo, A. Gargioni, M. Guerrini, C. Maioli); 3 ind. in volo a Gottolengo l'8 dicembre 61 I NO (A. Celestani); uno il 12 dicembre su un albero presso Gambara (A. Gargioni),

## CICONIIDAE

**Cicogna bianca** *Ciconia ciconia*: 1 ind. in sosta prolungata nei campi presso la cascina “Remondina” di Manerbio dal 21 marzo al 1 aprile (P. Bricchetti).

## PHOENICOPTERIDAE

**Fenicottero** *Phoenicopterus roseus*: 31 ind. in volo il 5 maggio a Remedello, diretti verso Casalmoro (G. Barbieri). Specie accidentale per la nostra provincia, con 6 segnalazioni note; un gruppo così numeroso non era mai stato osservato.

## ACCIPITRIDAE

**Gipeto** *Gypaetus barbatus*: 1 ind. osservato il 29 agosto in Val Grande, località Caret, nell'alta Valcamonica (A. Delle Monache). Trattasi sicuramente di un individuo rilasciato nell'ambito del Progetto di reintroduzione sulle Alpi. Un individuo era stato osservato nel giugno 2003 in località Case di Viso, sopra i laghi di Ercavallo (M. Guerrini, oss. pers.). Terza segnalazione per la provincia.

**Astore** *Accipiter gentilis*: un maschio osservato in una termica il 7 ottobre sul lago di Garda a Colombare di Sirmione, proveniente da nord e diretto in picchiata verso un gruppo di storni (A. Gargioni). Probabile subadulto in possibile dispersione post-riproduttiva. Considerato raro nell'entroterra gardesano, ma mai segnalato così a sud (DUSE e CAMBI 1980).

## FALCONIDAE

**Falco pellegrino** *Falco peregrinus*: conferma della sempre maggiore presenza della specie in pianura, anche in periodo invernale: una femmina adulta disturbata da uno Sparviere *Accipiter nisus* presso Gambara, 61 I NE; 1 ind. in caccia l'1 marzo presso Gottolengo (A. Gargioni) e un adulto in alimentazione il 24 novembre presso Leno (N. Grattini).

## RALLIDAE

**Folaga** *Fulica atra*: 1 ind. parzialmente albino osservato il 22 marzo al porto di S. Felice del Benaco (A. Gargioni, R. Barezzi). Presentava alcune penne sul ventre, tutto il dorso e la coda bianchi e sembrava tollerato da un gruppo di conspecifici.

## GRUIDAE

**Gru** *Grus grus*: 18 ind. in formazione sopra Gottolengo il 26 novembre, in volo da NNE a SSW (D. Lampugnani). Gruppi in migrazione sono stati osservati anche in altre parti dell'Italia settentrionale.

## RECURVIROSTRIDAE

**Cavaliere d'Italia** *Himantopus himantopus*: 4 ind. osservati l'11 maggio a Montichiari 47 II SE, presso un appostamento fisso da caccia, dove l'acqua è presente tutto l'anno formando una vera e propria zona umida (E. Bollin). La specie in provincia è considerata migratrice regolare e nidificante irregolare. Dato il periodo si potrebbe pensare ad una nidificazione probabile.

## CHARADRIIDAE

**Pavoncella** *Vanellus vanellus*: 1 ind. isolato osservato il 22 marzo, posato sulle rocce affioranti di fronte all'Isola del Garda (A. Gargioni, R. Barezzi). Inusuale la presenza sia per il tipo di ambiente, che per il settore lacustre, in quanto sul Lago di Garda è comune durante la migrazione solo nella parte bassa (DUSE e CAMBI 1980). Nidificazione probabile a S. Martino della Battaglia, 48 III NE, con osservazione ripetuta di 2 coppie territoriali il 26 marzo e per tutto il mese di aprile (A. Rossi); 1 ind. presente l'11 aprile presso un appostamento fisso di caccia per acquatici a Montichiari, 47 II SE, farebbe pensare ad una probabile nidificazione (E. Bollin).

## SCOLOPACIDAE

**Pittima minore** *Limosa lapponica*: 1 giovane molto confidente osservato il 16 settembre in pastura sulla spiaggia vicino a Sassabaneke presso Iseo (R. Bonetti). Considerata migratrice probabilmente regolare sul Lago di Garda; si tratta del primo avvistamento per il Lago d'Iseo.

## STERCORARIIDAE

**Labbo** *Stercorarius parasiticus*: 1 ind. in morfismo scuro osservato il 15 e 16 ottobre sul basso Lago di Garda tra Peschiera e Desenzano (S. Pirola, G. Parmeggiani). Considerato migratore irregolare; l'ultimo avvistamento provinciale è riportato in Appendice.

## LARIDAE

**Gabbiano comune** *Larus ridibundus*: una coppia nidificante, osservata il 23 aprile nella R. N. Torbiere del Sebino in Lametta 47 IV NO (M. Guerrini). Prima nidificazione accertata in questo settore della Riserva.

**Gavina** *Larus canus*: ripetute osservazioni nella bassa pianura: 150 ind. in alimentazione presso campi arati e stoppie di mais, il 25 gennaio ad Alfianello 47 III SO, aggregati a 150 *Larus ridibundus* e 100 *Larus michahellis*; 14 ind. a Gottolengo in volo verso i dormitori con direzione N-NE (A. Gargioni, D. Quaranta, N. Anni); 60 ind. a Gottolengo in volo verso i siti di foraggiamento. Durante un conteggio a Gottolengo il 2 febbraio, censiti 687 ind. in vari gruppi con numerosi *Larus ridibundus* (A. Gargioni). Notevole incremento di presenze sui bacini lacustri, oltre che in pianura, rispetto agli anni passati.

**Mignattino piombato** *Chlidonias hybridus*: 1 ind. in alimentazione il 6 gennaio nel porto di Rivoltella, loc. "Zattera", 48 III NE (S. Pirola). Rivisto il giorno 11 al porto Galeazzi di Sirmione, in occasione del censimento degli acquatici svernanti.

Specie	Lago di Garda	Lago d'Iseo	Torbiere d'Iseo	Lago d'Idro
Strolaga minore <i>Gavia stellata</i>	2 (1)			
Strolaga mezzana <i>Gavia arctica</i>	85 (77)			
Tuffetto <i>Tachybaptus ruficollis</i>	331 (102)	22	8	
Svasso maggiore <i>Podiceps cristatus</i>	3063 (2113)	1121	35	251
Svasso collaroso <i>Podiceps grisegena</i>	5 (1)			
Svasso cornuto <i>Podiceps auritus</i>	1			
Svasso piccolo <i>Podiceps nigricollis</i>	3693 (2228)	1		
Cormorano <i>Phalacrocorax carbo</i>	1135 (700)	194	296	67
Tarabuso <i>Botaurus stellaris</i>			3	
Airone cenerino <i>Ardea cinerea</i>	64 (63)	17	26	55
Cigno reale	204 (129)	238		

<i>Cygnus olor</i>				
Oca facciabianca <i>Branta leucopsis</i>	2			
Oca egiziana <i>Alopochen aegyptiaca</i>	1			
Anatra sposa <i>Aix sponsa</i>	2 (1)			
Germano reale <i>Anas platyrhynchos</i>	1273 (517)	163	52	174
Anatre germanate	287 (203)	9		
Mestolone <i>Anas clypeata</i>			4	
Fistione turco <i>Netta rufina</i>	37 (30)			
Moriglione <i>Aythya ferina</i>	266 (177)		371	4
Moretta <i>Aythya fuligula</i>	265 (19)		54	1
Quattrocchi <i>Bucephala clangula</i>	26			
Smergo maggiore <i>Mergus merganser</i>			1	
Porciglione <i>Rallus aquaticus</i>	1		1	
Gallinella d'acqua <i>Gallinula chloropus</i>	18 (8)	2	7	
Folaga <i>Fulica atra</i>	14184 (8472)	1535	4	36
Mignattino piombato <i>Chlidonias hybridus</i>	(1)			

Tab. 2 – Elenco sistematico degli uccelli acquatici censiti nel gennaio 2004 nei maggiori bacini lacustri bresciani. I valori per il Lago di Garda sono relativi agli individui censiti su tutto il bacino lacustre (Brescia, Verona e Trento), tra parentesi quelli relativi alla sola provincia di Brescia. I totali relativi al lago di Garda sono tratti da Rubolini *et al.* 2004.

Rilevatori Lago d'Iseo e R.N. Torbiere del Sebino: M. Guerrini, R. Bonetti, R. Bertoli, E. Bassi.

Rilevatori Lago di Garda (parte bresciana): A. Gargioni, A. Mutti, G. Piotti, F. Zanardini, A. Pasqua, A. Rossi, D. Lampugnani, P. Girardi, M. Castrini, V. Longoni,, G. Gottardi, A. Peruz, R. Sacchi, G. Romagnoli, A. Gentilli, G. Fasoli, G. Boncoraglio, F. Ficetola, G.E.V.

Rilevatori Lago d'Idro: A. Micheli

#### COLUMBIDAE

**Colombella** *Columba oenas*: riconferma dello svernamento, con almeno 5 ind. visti il 22 gennaio presso un dormitorio di Colombaccio *Columba palumbus* presso Monticelli d'Oglio di Verolavecchia (R. Bertoli, A. Gargioni).

#### CUCULIDAE

**Cuculo** *Cuculus canorus*: 2 ind. in canto il 28 marzo, il primo in località Amburana di Gargnano, presso una boscaglia termofila a 300 m (A. Micheli), il secondo a Cima Comer a 1230 m 35 III SE (Alessandro Micheli, Aldo Micheli, F. Zanardini, A. Gargioni, S. Pirola). La data è da considerarsi precoce per queste località in quanto la specie normalmente compare almeno 10-15 gg. dopo.

#### STRIGIDAE

**Assiolo** *Otus scops*: 1 ind. in canto in periodo riproduttivo presso la cascina Pica di Leno, 47 II SO (M. Tosoni); tale presenza potrebbe far pensare ad una ricolonizzazione della bassa pianura, dove la specie non viene segnalata come nidificante da alcuni decenni.

**Gufo di palude** *Asio flammeus*: 1 ind. recuperato il 16 novembre nel comune di Orzinuovi ed inviato al Centro Recupero Rapaci di Valpredina-BG (A. Sguazzi, E. Bollin). Sempre rare le presenze di questa specie nella nostra provincia.

#### APODIDAE

**Rondone pallido** *Apus pallidus*: 7 ind. osservati il 23 ottobre in migrazione sul centro abitato di Rivoltella di Desenzano (A. Rossi). Sempre scarse le segnalazioni di questa specie che nidifica regolarmente in alcuni centri urbani delle province limitrofe.

#### ALAUDIDAE

**Tottavilla** *Lullula arborea*: 2 maschi cantori il 6 giugno sul monte Guglielmo, in un ambiente a pascolo a 1300 m s.l.m., 34 III NE (R. Bertoli). Considerata nidificante irregolare, non si hanno segnalazioni della presenza in periodo riproduttivo dagli anni '980 (BRICHETTI e CAMBI 1985). Osservati 17 individui l'1 gennaio presso una marcita a Padernello di Borgo S. Giacomo, 47 III SO (R. Bertoli, M. Caffi). Un gruppo di 12 individui l'8 dicembre in un campo di stoppie presso Milzano, 61 I NO (A. Gargioni). Prime segnalazioni confermate in periodo invernale relative alla bassa pianura; le precedenti segnalazioni riguardavano l'anfiteatro morenico del Garda e la bassa Valle Sabbia (BRICHETTI e CAMBI 1990).

#### HIRUNDINIDAE

**Balestruccio** *Delichon urbicum*: 1 ind. osservato il 31 gennaio a Mompiano, periferia di Brescia (G. Feroldi). Difficile stabilire se si tratta di un migratore precoce o di un occasionale caso di svernamento.

#### BOMBYCILLIDAE

**Beccofrusone** *Bombycilla garrulus*: vengono riportati i dati raccolti da Rocco Leo sulla recente invasione di questa specie boreale che ha interessato principalmente le regioni alpine italiane nell'inverno 2004-05. Gli avvistamenti nel Bresciano sono iniziati a novembre e sono continuati ininterrottamente fino ai primi di maggio (date estreme: 8 novembre 2004 - 7 maggio 2005), confermando quanto rilevato nella vicina Svizzera. L'invasione ha interessato tutta la provincia, principalmente le zone montane e collinari, con alcune osservazioni anche nella bassa pianura. Il maggior numero di segnalazioni proviene dalla Val Trompia e si riferisce sia a individui singoli sia a gruppi di poche decine, distribuiti dalla media valle (Tavernole s/Mella, Collio, Bovegno, Pezzaze, Marmentino) fino ai 1500 m del Monte Maniva (R. Bonetti, M. Bosio, S. Capelli, V. Coltrini, A. Foglio, E. Ghidoni, F. Lamberti, R. Leo, L. Scalvini). Per la Valle Camonica si ha una sola segnalazione di un gruppo di circa 100 ind. svernanti a Ponte di Legno, rimasti in zona fino al 7 maggio 2005 (P. Bricchetti). Poche le segnalazioni anche per la Valle Sabbia, con piccoli gruppi osservati presso Treviso Bresciano, Capovalle, Barghe e Bagolino (P. Cucchi, G. Compagnoni, A. Micheli). Segnalazioni di alcuni individui anche per la zona del Lago di Garda (Limone, Gargnano e Tremosine) e per l'entroterra collinare a Prevalle (D. Ardighò, A. Pasqua, Servizio vigilanza Alto Garda Bresciano). Per la pianura esiste una sola segnalazione di alcuni individui presso Borgo San Giacomo (M. Caffi). I vari gruppi frequentavano per alimentarsi sia ambienti aperti sia giardini urbani, preferendo piante baccifere, soprattutto *Sorbus aucuparia*. L'analisi di un campione di 35 individui osservati evidenzia un rapporto giovani:adulti di 5:1 (differenza significativa) e un rapporto quasi paritario tra i sessi, a leggero favore dei maschi (R. Leo).

#### TURDIDAE

**Passero solitario** *Monticola solitarius*: censiti il 23 maggio 6 maschi cantori presso le "cave del Tesio" in comune di Serle (M. Gobbini). Tali cave, in parte attive e in parte dismesse, occupano senza soluzione di

continuità il versante meridionale di una collina tra i 300 e i 700 m s.l.m., per un'estensione di circa 1 km<sup>2</sup>. Densità notevole rispetto a quanto riscontrato a livello regionale (Lardelli in BRICHETTI e FASOLA 1990).

**Tordo oscuro** *Turdus obscurus*: un individuo trovato morto il 16 ottobre 2003 sul Monte Ladino in comune di Lumezzane (SASSI 2004). Terza segnalazione per la provincia di Brescia.

#### SYLVIIDAE

**Lui piccolo** *Phylloscopus collybita*: durante una sessione di inanellamento a Padernello di Borgo S. Giacomo, il 26 novembre è stato ricatturato un individuo di questa specie inanellato il 31 agosto 2002 a Hochsadt in Germania (M. Caffi).

**Bigia grossa** *Sylvia hortensis*: viene confermata da nuovi dati la presenza in periodo riproduttivo in due tavolette dell'atlante degli uccelli nidificanti (BRICHETTI e CAMBI 1985): due maschi in canto, uno il 27 giugno in ambiente cespuglioso termofilo sopra Salò (R. Bonetti L., Beghellini), l'altro il 30 maggio ai margini di una boscaglia termofila in località Sasso nel comune di Manerba d/Garda (A. Micheli). Altrove, due maschi in canto il 26 maggio in prati e arbusteti a 1100 m s.l.m. sul Monte Lividino presso Marcheno, 34 II SO, non ritrovati in successivi controlli (S. Capelli).

**Codirosso** *Phoenicurus phoenicurus*: un maschio in abito riproduttivo osservato il 9 gennaio a Verolavecchia, 61 IV NO (M. Caffi). Per la Lombardia si conoscono solo casi sporadici di presenza invernale (FORNASARI *et al.* 1992).

#### CORVIDAE

**Cornacchia nera** *Corvus corone corone*: un individuo osservato il 29 febbraio presso Seniga in alimentazione con alcune cornacchie grigie (A. Gargioni). Sempre più frequenti le presenze in pianura di questa sottospecie a distribuzione provinciale montana (cfr. GARGIONI e GUERRINI 2005).

#### EMBERIZIDAE

**Zigolo nero** *Emberiza cirlus*: a conferma del recente incremento delle segnalazioni nelle aree termofile provinciali (cfr. GARGIONI e GUERRINI 2003), osservati due maschi in canto il 23 maggio presso la cave del Tesio in comune di Serle, 47 I SE (M. Gobbini).

**Migliarino di palude** *Emberiza schoeniclus*: durante una sessione d'inanellamento a Padernello di Borgo S. Giacomo, il 26 novembre è stato ricatturato un individuo di questa specie inanellato il 28 ottobre 2000 nell'Oasi di Marano Lagunare in Friuli Venezia Giulia (M. Caffi).

### APPENDICE

#### ANATIDAE

**Oca egiziana** *Alopochen aegyptiacus*: una coppia osservata ripetutamente dal 25 marzo fino a metà aprile, anche in atteggiamento territoriale, nelle Lame della R. N. Torbiere del Sebino (A. Danesi, R. Bonetti). Individuo certamente aufugo.

#### PSITTACIDAE

**Parrocchetto dal collare** *Psittacula krameri*: 1 ind. osservato il 25 settembre in un ambiente boscato all'interno dell'aerostazione di Brescia-Montichiari (A. Gargioni). La presenza di questa specie esotica a distribuzione tropicale, ormai naturalizzata in alcune nazioni europee compresa l'Italia, potrebbe far pensare ad una possibile futura colonizzazione della nostra provincia.

## DATI INEDITI 2003

### STERCORARIIDAE

**Labbo** *Stercorarius parasiticus*: 1 ind. adulto in morfismo chiaro, osservato il 28 settembre sul Lago d'Iseo in località Sassabanek (R. Bonetti).

### TURDIDAE

**Tordo golanera** *Turdus atrogularis*: una femmina giovane catturata nella prima metà di ottobre nell'impianto di cattura a scopo venatorio di Baremone in comune di Anfo. Il piumaggio perfetto fa ritenere il soggetto di origine selvatica (A. Micheli). Terza segnalazione per il bresciano; le precedenti due si riferiscono a singoli individui catturati nel 1983 e 1984 (BRICHETTI e MASSA 1987).

## ERRATA CORRIGE

Resoconto ornitologico 2002, pagina 224 in Cicogna nera, al rigo 2, sostituire SE-NO con SO-NE

Resoconto ornitologico 2002, pagina 225 in Albanella pallida, al rigo 3, sostituire SE-NO con SO-NE

Resoconto ornitologico 2003, pagina 231, in Aquila anatraia minore, al rigo 8, sostituire 1983 con 1993

## BIBLIOGRAFIA

- BRICHETTI P., 1994. Situazione dell' avifauna della provincia di Brescia (Lombardia) aggiornamento 1993. *Natura Bresciana*, 29: 221-249.
- BRICHETTI P. e CAMBI D., 1985 - Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (Lombardia). 1980 - 1984. *Monografie di "Natura Bresciana"*, 8: 142 pp.
- BRICHETTI P. e CAMBI D., 1990. Atlante degli uccelli svernanti in provincia di Brescia (Lombardia) inverni dal 1984-85 al 1987-88. *Monografie di Natura Bresciana*, 14: 1-111.
- BRICHETTI P. e FASOLA M., 1990. Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia (1983-1987). Editoriale Ramperto, Brescia: 241 pp.
- BRICHETTI P. e GARGIONI A., 2003. Check-list degli uccelli della provincia di Brescia (Lombardia) aggiornata a tutto il 1999. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 33: 93-105.
- BRICHETTI P. e MASSA B., 1987. Aggiunte e rettifiche alla Check-list degli uccelli italiani. 1. *Riv. ital. Orn.*, 57 (3-4): 157-160.
- FORNASARI L., BOTTONI L., MASSA R., FASOLA M., BRICHETTI P. e VIGORITA V., 1992. Atlante degli uccelli svernanti in Lombardia. *Regione Lombardia e Univ. Studi Milano*: 378 pp.
- GARGIONI A e GUERRINI M., 2005. Resoconto ornitologico bresciano 2003. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 34: 229-235.
- RUBOLINI D., VIGORITA V., CUCE' L. & Fasola M. 2004. Censimento Annuale degli Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2004. *Regione Lombardia*, Milano.
- SASSI W., 2004. Ritrovamento di Tordo oscuro *Turdus obscurus* in provincia di Brescia. *Uccelli d'Italia*, 29: 86-88.