

ARTURO GARGIONI* e MARCO GUERRINI*

RESOCONTO ORNITOLOGICO BRESCIANO 2005

*Gruppo Ricerche Avifauna

Parole chiave – Segnalazioni ornitologiche, provincia di Brescia

RIASSUNTO – Vengono accorpate, divise per anno, le segnalazioni ornitologiche più interessanti per la provincia di Brescia relative al periodo 2005. Sono esclusi i dati già pubblicati su riviste specializzate.

Key words – Ornithological report, province of Brescia.

SUMMARY – 2005 ornithological report for the province of Brescia (Northern Italy). This report considers the more interesting ornithological record of 2005.

PREMESSA

I criteri adottati per vagliare le osservazioni sono i seguenti:

- specie accidentali, rare o comunque poco osservate nel territorio bresciano, anche solo in relazione a determinati periodi dell'anno;
- specie comuni, ma presenti in un dato momento in quantità non consueta;
- soggetti che presentano comportamenti poco noti o anomalie del piumaggio;
- soggetti inanellati;
- casi di nidificazione di specie rare o localizzate, rilevati successivamente all'Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (1980-1984) e relativo aggiornamento (1985-1991).

Non sono state prese in considerazione le notizie già pubblicate su riviste del settore.

Ricordiamo ai collaboratori di fare riferimento, per la valutazione dei propri dati, al lavoro sulla "Situazione dell'avifauna bresciana" (BRICHETTI 1994) ed alla "Check-list della provincia di Brescia aggiornata al 1999" (BRICHETTI e GARGIONI 2003). Inoltre, ai fini della pubblicazione, è utile fornire un'eventuale documentazione fotografica delle osservazioni più interessanti.

Vengono considerate in un'appendice, anche le specie esotiche (fuggite dalla cattività), osservate in provincia di Brescia, nonché alcune segnalazioni inedite relative agli anni precedenti.

La classificazione e nomenclatura sono in accordo con la recente Lista degli uccelli italiani CISO COI.

ELENCO DEI COLLABORATORI

Nicola Anni (Manerbio); Roberto Bertoli (Brione di Gussago); Roberto Bonetti (Gussago); Enrico Bresciani (Brescia); Pierandrea Brichetti (Verolavecchia); Mario Caffi (Motella di Borgo S. Giacomo); Stefania Capelli (Bovezzo); Gianbattista Compagnoni (Bedizzole); Renato Frassine (Cellatica); Arturo Gargioni (Gottolengo); Marco Gobbini (Paitone); Marco Guerrini (Provaglio d'Iseo); Rocco Leo (Collebeato); Alessandro Micheli (Treviso bresciano); Stefano Pirola (Lonato); Dario Quaranta (Manerbio).

ARDEIDAE

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*: regolare svernamento di questa specie con un max. di 124 individui presso il depuratore di un'azienda di trasformazione avicola a Gottolengo, 61 I NO. Gli individui sfruttavano gli scarti di lavorazione che entravano nel depuratore e talvolta rimanevano in loco anche

nelle ore notturne. Analoga situazione viene riscontrata anche presso il macello di Pegognaga, MN (N. Grattini com. pers.) (A. Gargioni). E' questo il gruppo svernante più numeroso riscontrato fino ad ora in provincia.

Specie	Lago di Garda	Lago d'Iseo	Torbiere d'Iseo	Lago d'Idro
Strolaga minore <i>Gavia stellata</i>	1			
Strolaga mezzana <i>Gavia arctica</i>	105 (13)			
Tuffetto <i>Tachybaptus ruficollis</i>	268 (60)	58	2	
Svasso maggiore <i>Podiceps cristatus</i>	4986 (3961)	964	23	343
Svasso coloroso <i>Podiceps grisegena</i>	6 (2)			
Svasso piccolo <i>Podiceps nigricollis</i>	1757 (1316)	33		
Cormorano <i>Phalacrocorax carbo</i>	935 (531)	144	287	38
Tarabuso <i>Botaurus stellaris</i>	1		3	
Airone cenerino <i>Ardea cinerea</i>	49 (48)	5	17	49
Cigno reale <i>Cygnus olor</i>	114 (75)	196	5	5
Oca egiziana <i>Alopochen aegyptiaca</i>	1			
Germano reale <i>Anas platyrhynchos</i>	1436 (425)	295	51	242
Canapiglia <i>Anas strepera</i>	2			
Anatre germanate	88 (75)		4	
Alzavola <i>Anas crecca</i>			4	
Mestolone <i>Anas clypeata</i>	7			
Fistione turco <i>Netta rufina</i>	64 (64)			
Moriglione <i>Aythya ferina</i>	806 (281)	1	178	
Moretta <i>Aythya fuligula</i>	301 (53)		41	8
Moretta grigia <i>Aythya marila</i>	1			
Orchetto marino <i>Melanitta nigra</i>	3 (3)			

Orco marino <i>Melanitta fusca</i>	9 (9)			
Quattrocchi <i>Bucephala clangula</i>	23 (4)			
Smergo minore <i>Mergus serrator</i>	3	3		
Porciglione <i>Rallus aquaticus</i>	12 (5)		5	
Gallinella d'acqua <i>Gallinula chloropus</i>	25 (1)	3	4	
Folaga <i>Fulica atra</i>	13562 (8046)	3137	7	39
Piro piro piccolo <i>Actitis hypoleucos</i>	1 (1)			
Gavina <i>Larus canus</i>	563 (95)			
Gabbiano comune <i>Larus ridibundus</i>	2995 (1109)	496	132	111
Zafferano <i>Larus fuscus</i>	2 (2)			
Gabbiano reale nordico <i>Larus argentatus</i>	1 (1)			
Gabbiano reale <i>Larus michahellis</i>	861 (315)			
Mignattino piombato <i>Chlidonias hybrida</i>	1 (1)			

Tab. 1 – Elenco sistematico degli uccelli acquatici censiti nel gennaio 2005 nei maggiori bacini lacustri bresciani. I valori per il Lago di Garda sono relativi agli individui censiti su tutto il bacino lacustre (Brescia, Verona e Trento), tra parentesi quelli relativi alla sola provincia di Brescia. I totali relativi al lago di Garda sono tratti da Rubolini *et al.* 2005.

Rilevatori Lago d'Iseo e R.N. Torbiere del Sebino: Bertoli R., Guerrini M., Sguazzi G.

Rilevatori Lago di Garda (parte bresciana): A. Gargioni, A. Mutti, G. Piotti, F. Zanardini, M. Castrini, G. Gottardi, A. Peruz, R. Sacchi, G. Fasoli, S. Pirola, D. Rubolini, G. Parmeggiani, C. Salandini, M. Bresciani, V. Longoni, M. Brambilla, D. Putignano, G.E.V.

Rilevatori Lago d'Idro: Micheli A.

DATA	LOCALITA'	N° INDIVIDUI
09/01/2005	L. GARDA,	737
11/01/2005	LAGO D'ISEO E TORBIERE	491
09/01/2005	LAGO D'IDRO	38
09/01/2005	F. OGLIO	167
23/01/2005	F. MELLA	259
	TOTALI	1523

Tab. 2 - Cormorano *Phalacrocorax carbo* : risultati 2005 del censimento provinciale ai dormitori

Rilevatori: A. Gargioni, D. Quaranta, N. Anni, M. Guerrini, A. Micheli

COLUMBIDAE

Colombella *Columba oenas*: sempre più regolare nella nostra provincia la presenza anche invernale, di questo columbride, con 26 individui osservati il 16 gennaio presso Monticelli d'Oglio in comune di

Verolavecchia, 61 IV NO (A. Gargioni, D. Quaranta). Nello stesso periodo e nello stesso luogo, sono stati contati al rientro serale, presso un dormitorio su pioppo coltivato, 10-13.000 colombacci *Columba palumbus* (P. Brichetti, M. Caffi, S. Capelli). E' questo la maggiore concentrazione di individui svernanti osservati in provincia di Brescia dopo quella segnalata nel 1990 (Caffi in MICHELI e Busetto 1992).

PICIDAE

ALAUDIDAE

Calandrella *Calandrella brachydactyla*: un individuo in migrazione è stato osservato il 9 maggio in un campo falciato ai margini della R.N: Torbiere del Sebino (R. Bonetti, M. Guerrini). L'ultima segnalazione nota di questa specie, considerata di transito scarso e poco regolare risale al 1993 (Busetto e Gargioni 1996).

Tottavilla *Lullula arborea*: Nuovo indizio di nidificazione probabile con tre maschi in canto nel mese di giugno presso la cava del Monte Tarantino a 400 m s.l.m., in comune di Mazzano, 47 I SE. L'ambiente era costituito da boscaglia termofila e pietraie carsiche (R. Bonetti, E. Bresciani, G.B. Compagnoni, M. Gobbini, A. Micheli). la nidificazione di questa specie risulta estremamente localizzata nella nostra provincia. A conferma di una maggiore presenza di questa specie anche al di fuori del periodo riproduttivo, sei individui presenti il 27 e 28 febbraio in un campo di stoppie, coperto da un leggero strato di neve presso Lonato (S. Pirola).

HIRUNDINIDAE

Rondine montana *Ptyognoprogne rupestris*: osservata il 24 luglio almeno una coppia nidificante sotto il ponte della ferrovia a Desenzano del Garda, 112 m s.l.m., 48 III NO (S. Pirola). E' questa la quota più bassa dopo quella riscontrata nel 1999 a Collebeato (Gargioni e Pedrali 2003).

Rondine *Hirundo rustica*: a conferma di una presenza regolare della specie anche in periodo invernale soprattutto in ambienti termofili della provincia, un individuo osservato in volo il 2 gennaio sulla Rocca di Manerba, 48 IV NO (A. Gargioni).

CINCLIDAE

Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*: un individuo osservato il 27 gennaio lungo l'asta del fiume Oglio a 150 m s.l.m., in comune di Capriolo, 46 IV NE (R. Bertoli). Non sono nuovi avvistamenti di questa specie in ambienti di pianura, soprattutto in periodo invernale come confermato da precedenti ricerche (Brichetti e Cambi 1990), ma eccezionalmente anche in periodo riproduttivo come successo in provincia di Cremona (FERRI 1987).

TURDIDAE

Cesena fosca *Turdus eunomus*: un individuo rinvenuto morto nel mese di novembre presso Quinzano (M. Caffi). Quarta segnalazione confermata per la provincia in quanto precedentemente era considerata sottospecie di *Turdus naumanni*. (cfr. BRICHETTI e GARGIONI 2003).

Stiaccino *Saxicola rubetra*: due osservazioni relative al periodo invernale di questa specie migratrice transaariana, una femmina inanellata lungo il fiume Oglio ad Acqualunga il 29 novembre, è rimasta in loco fino al 20 dicembre (M. Caffi); due maschi al 1° inverno osservati il 24 gennaio a Corticelle di Dello (M. Busetto). Non si conoscono precedenti segnalazioni invernali per il bresciano, mentre per la Lombardia sono note alcune presenze (FORNASARI et al., 1992).

Culbianco *Oenanthe oenanthe*: una femmina adulta della sottospecie "*leucorhoa*", è stata catturata e inanellata il 24 agosto presso il Roccolo di Baremone in comune di Anfo (A. Micheli). Questa sottospecie "nordica", che si riproduce in Islanda e in Groenlandia, seppur considerata di passo regolare in Italia, viene raramente osservata e registrata.

SYLVIIDAE

Lui piccolo *Phylloscopus collybita*: a conferma di una certa regolarità della sottospecie “*tristis*” durante la migrazione, un individuo osservato il 12 marzo ai margini di un canneto sotto le “Grotte di Catullo”, punte settentrionale della penisola di Sirmione (R. Leo). La conoscenza delle due sottospecie sul campo da parte dell’osservatore e la ridotta distanza dell’osservazione, hanno permesso di identificare con certezza questa difficile forma sottospecifica. Trattasi del primo avvistamento nel settore orientale della provincia.

Lui forestiero *Phylloscopus inornatus*: un individuo osservato l’1 novembre in alimentazione insieme a *Regulus regulus* e *Phylloscopus collybita*, in un giardino alla periferia di Gottolengo (A. Gargioni). Tale osservazione è da mettere in relazione ad una “invasione” che ha interessato gran parte dell’Europa occidentale ed è in linea con quanto descritto da CAMBI e CAMBI 1986, relativamente alla migrazione e fenologia della specie in Italia e in Europa meridionale.

LANIIDAE

Averla piccola *Lanius collurio*: a conferma di una generalizzata regressione della specie in ambito provinciale che pare colpisca maggiormente i settori di pianura e di bassa collina, una ricerca effettuata sull’intero territorio comunale di Paitone (780 ettari) con un’escursione altitudinale tra 180 e 850 m s.l.m., ha dimostrato un dimezzamento della popolazione nidificante, passata dalle 30 coppie del 1995 alle 15 del 2005 (M. Gobbin).

Averla capirossa *Lanius senator*: uno, forse due individui osservati il 02 giugno sul Monte Falò in comune di Lonato (S. Pirola). Di passo scarso ma regolare, la data dell’osservazione potrebbe far pensare a migratori tardivi oppure ad una possibile nidificazione, dato l’ambiente idoneo alla specie.

CORVIDAE

Taccola *Corvus monedula*: alcuni individui presenti in febbraio e in aprile sul campanile della chiesa di Cellatica, 47 IV SE (R. Frassine). Probabile ulteriore espansione della specie in provincia.

Cornacchia nera *Corvus corone corone*: a conferma della presenza in pianura di questa sottospecie a distribuzione montana (cfr. GARGIONI e GUERRINI 2005), un individuo il 5 febbraio presso Corticelle; 2 individui il 19 febbraio presso Cigole; uno il 23 febbraio e il 2 marzo presso Milzanello e uno il 6 marzo presso Pralboino. Alcuni individui risultavano imbrancati con *Corvus corone cornix*, altri isolati. Tutte le osservazioni riguardano l’asta del fiume Mella (N. Anni).

EMBERIZIDAE

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*: un maschio giovane osservato il 12 marzo su rocce affioranti presso le Grotte di Catullo, penisola di Sirmione (R. Leo). Anche se considerato migratore regolare, l’ultima segnalazione provinciale risale al 1995 (GARGIONI e PEDRALI 1998).

BIBLIOGRAFIA

BUSETTO M., GARGIONI A., 1996. Resoconto ornitologico bresciano 1993. *Natura Bresciana*, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 30: 275-283.

CAMBI D., CAMBI L., 1986. Migrazione e fenologia del Lui forestiero *Phylloscopus inornatus*, in Italia e nell’Europa meridionale. *Riv. Ital. Ornit.* 56 (1-2): 79-94.

GARGIONI A., GUERRINI M., 2005. Resoconto ornitologico bresciano 2003. *Natura Bresciana*, Ann. Mus. Civ. sc. Nat. Brescia, 34: 229-235.

- GARGIONI A., PEDRALI A., 1998. Resoconto ornitologico bresciano 1999. *Natura Bresciana*, Ann. Mus. Civ. sc. Nat. Brescia, 31: 269-278.
- GARGIONI A., PEDRALI A., 2003. Resoconto ornitologico bresciano 1999. *Natura Bresciana*, Ann. Mus. Civ. sc. Nat. Brescia, 33: 229-235.
- FERRI D., 1987. Nidificazione di merlo acquaiolo al Parco-zoo della preistoria di Rivolta d'Adda (Cremona), altitudine di 97 metri sul mare, nel 1985. *PIANURA*, 1: 109.
- MICHELI A. e Busetto M., 1992. Resoconto ornitologico bresciano 1990. *Natura Bresciana*, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 27: 223-232.
- RUBOLINI D., PELLITTERI ROSA D., VIGORITA V., CUCE' L. e FASOLA M., 2005. *Censimento Annuale degli Uccelli Svernanti in Lombardia. Resoconto 2005*. Regione Lombardia, Milano.